

## Übungen zu Analysis III

1. (a) Sei  $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  ein Polynom von 2 Veränderlichen. Zeigen Sie, dass

$$\int_0^1 \left( \int_0^1 f(x, y) dx \right) dy = \int_0^1 \left( \int_0^1 f(x, y) dy \right) dx.$$

- (b) Wiederholen Sie den Paragraphen über uneigentliche Integrale aus Analysis I.  
(c) Zeigen Sie, dass

$$\int_0^1 \left( \int_0^1 \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} dx \right) dy \neq \int_0^1 \left( \int_0^1 \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} dy \right) dx.$$

Ein wesentliches Ziel der Analysis III ist es, Bedingungen kennenzulernen, unter denen man die Integrationsreihenfolge vertauschen darf.

2. Sei  $n \in \mathbb{N}$ . Bestimmen Sie die kleinste Zahl  $\nu$ , so dass gilt: Sind  $Q, P \in \mathcal{Q}^n$ , so gibt es disjunkte Quader  $Q_1, \dots, Q_\nu \in \mathcal{Q}^n$  mit  $Q \setminus P = Q_1 \cup \dots \cup Q_\nu$ .
3. Sind  $A, B$  Teilmengen einer Menge  $X$ , so heißt

$$A \Delta B := (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$$

die symmetrische Differenz von  $A$  und  $B$ . Zeigen Sie, dass eine Teilmenge  $\mathcal{R}$  von  $\mathcal{P}(X)$  genau dann ein Ring von Teilmengen von  $X$  ist, wenn  $\mathcal{R}$  bezüglich der Operationen  $\Delta$  als Addition und  $\cap$  als Multiplikation ein kommutativer Ring im Sinne der Algebra ist.

**Abgabe:** Dienstag, den 24. Oktober 2006, 11.15 Uhr