

Einführung in die Funktionalanalysis

B Aufgabe 11.1: (Operator zu vorgegebenen Spektrum) (1+3+3+2 Punkte)

Seien $1 \leq p \leq \infty$ und $(\lambda_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine beschränkte Folge in \mathbb{K} . Wir betrachten den durch

$$(Tx)_n := \lambda_n x_n, \quad x \in \ell^p, n \in \mathbb{N},$$

definierten Operator $T : \ell^p \rightarrow \ell^p$.

- (i) Überzeugen Sie sich davon, dass $T \in \mathcal{L}(\ell^p)$.
- (ii) Zeigen Sie, dass $\sigma_p(T) = \{\lambda_n; n \in \mathbb{N}\}$.
- (iii) Zeigen Sie, dass $\sigma(T) = \overline{\{\lambda_n; n \in \mathbb{N}\}}$.
- (iv) Zeigen Sie, dass es zu jeder nichtleeren kompakten Menge $K \subseteq \mathbb{K}$ einen Operator T mit $\sigma(T) = K$ gibt.

B Aufgabe 11.2: (Multiplikationsoperatoren) (9 Punkte)

Sei $K \subseteq \mathbb{R}^n$ kompakt. Bestimmen Sie alle Funktionen $a \in C(K)$, für die der Multiplikationsoperator

$$M_a : L^2(K) \rightarrow L^2(K), \quad f \mapsto af$$

kompakt ist.

Aufgabe 11.3: (Punktspektrum des adjungierten Operators und Spektralradius)

- (i) Seien X ein Banachraum, $T \in \mathcal{L}(X)$ und $\lambda \in \mathbb{K}$. Zeigen Sie, dass dann

$$\lambda \in \sigma_p(T^*) \Leftrightarrow \overline{(\lambda - T)(X)} \neq X.$$

- (ii) Seien X ein Banachraum und $S, T \in \mathcal{L}(X)$ mit $ST = TS$. Zeigen Sie, dass dann

$$r(ST) \leq r(S)r(T).$$

Aufgabe 11.4: (Lemma von Ehrling)

Seien X, Y und Z Banachräume, $S \in \mathcal{K}(X, Y)$ und $T \in \mathcal{L}(Y, Z)$. Sei T injektiv. Zeigen Sie, dass dann

$$\forall \varepsilon > 0 \exists C_\varepsilon > 0 \forall x \in X : \|Sx\|_Y \leq \varepsilon \|x\|_X + C_\varepsilon \|TSx\|_Z.$$

Hinweis: Widerspruchsbeweis.