Halbeinfache Lie-Algebren

Holger Kammeyer (holger.kammeyer@hhu.de)

Inhalte

I Grundlagen

1. Lie-Algebren
2. Beispiele
3. Derivationen
4. Ideale
5. Automorphismen
6. Auflösbare Lie-Algebren
7. Nilpotente Lie-Algebren

II Strukturtheorie halbeinfacher Lie-Algebren

1. Der Satz von Lie
2. Jordan-Chevalley-Zerlegung
3. Killing-Form und Cartan-Kriterien
4. Zerlegung in einfache Ideale
5. Abstrakte Jordan-Zerlegung
6. Vollständige Reduzibilität von Darstellungen
7. Erhalt der Jordan-Zerlegung
8. Darstellungstheorie von $\mathfrak{sl}_2 K$
9. Wurzelraumzerlegung

III Wurzelsysteme

1. Eigenschaften der Wurzelraumzerlegung
2. Geometrie des Wurzelsystems
3. Abstrakte Wurzelsysteme
4. Klassifizierung der Wurzelsysteme
5. Automorphismen von Wurzelsystemen
6. Konjugations-, Isomorphie- und Existenzsatz
7. Automorphismen einfacher Lie-Algebren

Übungsblätter

Lösungen

Hauptquelle: James E. Humphreys: „Introduction to Lie algebras and representation theory“, Springer GTM 9

Lizenz: CC BY-SA 3.0 DE

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/>

I Grundlagen

I.1 Lie-Algebren

Sei K ein Körper.

Def. I.1.1 Eine Lie-Algebra über K ist ein K -Vektorraum $\mathfrak{g}$ mit einer Abbildung $[\cdot, \cdot]: \mathfrak{g} \times \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}$ (Lie-Klammer oder Kommutator genannt), sd. gilt:

(L1) $[\cdot, \cdot]$ ist bilinear.

(L2) Für alle $x \in \mathfrak{g}$ ist $[x, x] = 0$.

(L3) Für alle $x, y, z \in \mathfrak{g}$ gilt die Jacobi-Identität:
 $[x, [y, z]] + [y, [z, x]] + [z, [x, y]] = 0$.

Bemerkungen. • Aus (L1) und (L2) folgt $0 = [x+y, x+y] = [x, y] + [y, x]$, d.h. (L2)': $[x, y] = -[y, x]$.

• Ist $2 \neq 0$ in K , folgt aus (ii)' umgekehrt

$$[x, x] = -[x, x] \Leftrightarrow 2 \cdot [x, x] = 0 \Leftrightarrow [x, x] = 0, \text{ d.h. (ii)}$$

• Begriff der Unter-Lie-Algebra (kurz Unteralgebra) klar.

• Wir werden (fast) immer annehmen, dass $\dim_K \mathfrak{g} < \infty$.

• Homomorphismen von Lie-Algebren sind K -lineare Abb. von $\mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}'$ mit $\phi([x, y]) = [\phi(x), \phi(y)]$.

• ϕ ist ein Isomorphismus $\Leftrightarrow \ker \phi = \{0\}$ und $\text{im } \phi = \mathfrak{g}'$:

zu $x', y' \in \mathfrak{g}'$ wähle $x, y \in \mathfrak{g}$ mit $\phi(x) = x', \phi(y) = y'$.

$$\text{Dann gilt } \phi^{-1}([x', y']) = \phi^{-1}([\phi(x), \phi(y)])$$

$$= \phi^{-1}(\phi([x, y])) = [x, y] = [\phi^{-1}(x'), \phi^{-1}(y')].$$

I.2 Beispiele

(i) Sei V ein K -Vektorraum mit $\dim_K V = n < \infty$.

Dann wird $\mathfrak{g} = \text{End}(V)$ durch $[x, y] = x \cdot y - y \cdot x$ zu einer Lie-Algebra: (L1) und (L2) sind klar. (L3):

$$[x, [y, z]] = x \cdot [y, z] - [y, z] \cdot x = x(yz - zy) - (yz - zy)x$$

$= xyz - xzy - yzx + zyx$, zyklisch permutieren und aufsummieren ergibt null. Wir schreiben für diese Lie-Algebra fortan $\mathfrak{gl}(V)$ (zur Unterscheidung von der assoziativen Algebra $\text{End}(V)$).

Basiswahl in V liefert $\mathfrak{gl}(V) \cong \mathfrak{gl}_n(K)$ mit $\mathfrak{gl}_n(K) = \text{Mat}_n(K)$ und $[X, Y] = X \cdot Y - Y \cdot X$.

Unteralgebren von $\mathfrak{gl}(V)$ oder $\mathfrak{gl}_n(K)$ heißen **lineare Lie-Algebren**.

(ii) Folgende lineare Lie-Algebren heißen **klassische Lie-Algebren**:

Typ A_n : Wir nennen

$$\mathfrak{sl}_{n+1}(K) = \{x \in \mathfrak{gl}_{n+1}(K) : \text{Spur } x = 0\}$$

die **spezielle lineare Algebra**. Sie ist eine Unteralg. von $\mathfrak{gl}_{n+1}(K)$, weil $\text{Spur}([x, y]) = \text{Spur}(xy - yx) = \text{Spur}(xy) - \text{Spur}(yx) = 0$. Es gilt

$$\begin{aligned} \dim_K \mathfrak{sl}_{n+1}(K) &= \dim_K \ker(\text{Spur}: \mathfrak{gl}_{n+1}(K) \rightarrow K) = \\ &= (n+1)^2 - 1 = n^2 + 2n. \end{aligned}$$

Typ D_n : Wir nehmen

$$\mathfrak{so}_{2n}(K) = \{x \in \mathfrak{gl}_{2n}(K) : x^T m + m x = 0\}$$

mit $m = \begin{pmatrix} 0 & I_n \\ I_n & 0 \end{pmatrix}$ und $I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ die **(gerade) orthogonale Algebra**. Schreiben wir $x = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, gilt

$$x^T m = \begin{pmatrix} c^T & a^T \\ d^T & b^T \end{pmatrix} \text{ und } m x = \begin{pmatrix} c & d \\ a & b \end{pmatrix}, \text{ d.h. } x \in \mathfrak{so}_{2n}(K) \\ \Leftrightarrow b^T = -b, c^T = -c, a^T = -d, (d^T = -a).$$

Nachweis Unteralgebra: HA 1.1. Es gilt

$$\dim_K \mathfrak{so}_{2n}(K) = 2 \cdot \frac{n(n-1)}{2} + n^2 = 2n^2 - n, \text{ falls } 2 \neq 0 \text{ in } K.$$

Typ C_n : Wir nehmen

$$\mathfrak{sp}_{2n}(K) = \{x \in \mathfrak{gl}_{2n}(K) : x^T s + s x = 0\}$$

mit $s = \begin{pmatrix} 0 & I_n \\ -I_n & 0 \end{pmatrix}$ die **symplektische Algebra**.

Für $x = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ gilt $x \in \mathfrak{sp}_{2n}(K)$ genau dann, wenn $b^T = b, c^T = c, a^T = -d, (d^T = -a)$. Es gilt

$$\dim_K \mathfrak{sp}_{2n}(K) = 2 \cdot \frac{n(n+1)}{2} + n^2 = 2n^2 + n.$$

Typ B_n : Wir nehmen

$$\mathfrak{so}_{2n+1}(K) = \{x \in \mathfrak{gl}_{2n+1}(K) : x^T l + l x = 0\}$$

mit $l = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & I_n \\ 0 & I_n & 0 \end{pmatrix}$ die **(ungerade) orthogonale Algebra**.

Es gilt $x = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} \in \mathfrak{so}_{2n+1}(K)$ genau dann, wenn

$$a=0, d = -c^T, g = -b^T, h^T = -h, f^T = -f, e^T = -i.$$

Es folgt

$$\dim_K \mathfrak{so}_{2n+1}(K) = 2 \cdot n + 2 \cdot \frac{n(n-1)}{2} + n^2 = 2n^2 + n, \text{ falls } 2 \neq 0 \text{ in } K.$$

(d.h. $\dim_K \mathfrak{so}_{2n+1}(K) = \dim_K \mathfrak{sp}_{2n}(K)$.)

Beobachtung. Aus der Relation $a^T = -a$ bzw. $e^T = -e$ folgt $\mathfrak{so}_{2n+1}(K) \subseteq \mathfrak{sl}_{2n+1}(K)$, $\mathfrak{sp}_{2n}(K) \subseteq \mathfrak{sl}_{2n}(K)$, $\mathfrak{so}_{2n}(K) \subseteq \mathfrak{sl}_{2n}(K)$.

(iii) Wir nennen

$$\mathfrak{t}_n(K) = \left\{ x \in \mathfrak{gl}_n(K) : x_{ij} = 0 \text{ für } i > j \right\}$$

die Algebra der (oberen) Dreiecksmatrizen,

$$\mathfrak{n}_n(K) = \left\{ x \in \mathfrak{gl}_n(K) : x_{ij} = 0 \text{ für } i \geq j \right\}$$

die Algebra der strikten (oberen) Dreiecksmatrizen,
und

$$\mathfrak{d}_n(K) = \left\{ x \in \mathfrak{gl}_n(K) : x_{ij} = 0 \text{ für } i \neq j \right\}$$

die Algebra der Diagonalmatrizen. Offensichtlich ist $\mathfrak{d}_n(K)$ abelsch, d.h. $[x, y] = 0$ für alle $x, y \in \mathfrak{d}_n(K)$.

(iv) (Nur für Eingeweihte) Sei G eine reelle bzw. komplexe Lie-Gruppe. Dann bilden die links-invarianten Vektorfelder auf G mit Kommutator-Klammer

eine Lie-Algebra $\mathfrak{g} = \text{Lie}(G)$ über $\mathbb{R}$ bzw. $\mathbb{C}$.

Insbesondere gilt $\text{Lie}(SL_n \mathbb{C}) \cong \mathfrak{sl}_n \mathbb{C}$, $\text{Lie}(SO_n \mathbb{C}) \cong \mathfrak{so}_n \mathbb{C}$ und $\text{Lie}(Sp_{2n} \mathbb{C}) \cong \mathfrak{sp}_{2n} \mathbb{C}$.

I.3 Derivationen

Def. I.3.1 Eine K -Algebra ist ein K -Vektorraum $\mathcal{A}$ mit einer bilinearen Abb. $\cdot : \mathcal{A} \times \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$.

Bsp. $\cdot \text{Mat}_{n \times n}(K)$ ist eine K -Algebra mit Matrixmult.

- Die Hamilton-Quaternionen $\mathbb{H}$ sind eine $\mathbb{R}$ -Alg.
- Jede Lie-Algebra $\mathfrak{g}$. Schreiben dann $[\cdot, \cdot]$ statt $\cdot$.

Def. I.3.2 Sei $\mathcal{A}$ eine K -Algebra. Eine **Derivation** auf $\mathcal{A}$ ist eine K -lineare Abb. $\delta : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$, die die **Leibnizregel** $\delta(a \cdot b) = \delta(a) \cdot b + a \cdot \delta(b)$ für alle $a, b \in \mathcal{A}$ erfüllt.

Prop. I.3.3 Die Menge $\text{Der } \mathcal{A}$ der Derivationen auf $\mathcal{A}$ ist eine Unter-Lie-Algebra von $\mathfrak{gl}(\mathcal{A})$.

Bew. Offensichtlich ist $\text{Der } \mathcal{A}$ ein Untervektorraum.

Seien $\delta, \delta' \in \text{Der } \mathcal{A}$ und $a, b \in \mathcal{A}$. Dann gilt

$$[\delta, \delta'](ab) = (\delta\delta' - \delta'\delta)(ab) = \delta(\delta'(a)b + a\delta'(b))$$

$$- \delta'(\delta(a)b + a\delta(b)) = \delta\delta'(a)b + \delta'(a)\delta(b)$$

$$+ \delta(a)\delta'(b) + a\delta\delta'(b) - \delta'\delta(a)b - \delta(a)\delta'(b)$$

$$- \delta'(a)\delta(b) - a\delta'\delta(b) =$$

$$= (\delta\delta' - \delta'\delta)(a) \cdot b + a \cdot (\delta\delta' - \delta'\delta)(b) =$$

$$= [\delta, \delta'](a) \cdot b + a \cdot [\delta, \delta'](b),$$

also $[\delta, \delta'] \in \text{Der } \mathfrak{a}$. $\square$

Beachte: Ist $\mathfrak{g}$ eine Lie-Algebra, so ist also auch $\text{Der } \mathfrak{g}$ eine Lie-Algebra

Prop. I.3.4 Für $x \in \mathfrak{g}$ sei $\text{ad } x \in \text{End}(\mathfrak{g})$

definiert durch $\text{ad } x(y) = [x, y]$ für $y \in \mathfrak{g}$.

Dann ist $\text{ad } x \in \text{Der } \mathfrak{g}$.

Bew. Es gilt $\text{ad } x([y, z]) = [x, [y, z]] =$

$$\stackrel{(L3)}{=} -[y, [z, x]] - [z, [x, y]] =$$

$$\stackrel{(L2)'}{=} [y, [x, z]] + [[x, y], z] =$$

$$= [\text{ad } x(y), z] + [y, \text{ad } x(z)]. \quad \square$$

Prop. I.3.5 $\text{ad}: \mathfrak{g} \rightarrow \text{Der } \mathfrak{g}$ ist ein Homomorph.

Bew. Für $x, y, z \in \mathfrak{g}$ gilt

$$(\text{ad } x \text{ ad } y - \text{ad } y \text{ ad } x)(z) = [x, [y, z]]$$

$$- [y, [x, z]] \stackrel{(L3)}{=} - [z, [x, y]] - [y, [z, x]]$$

$$- [y, [x, z]] \stackrel{(L2)'}{=} [[x, y], z] = \text{ad}_{[x, y]}(z). \quad \square$$

Def. I.3.5 $\text{ad}: \mathfrak{g} \rightarrow \text{Der } \mathfrak{g}$ heißt die adjungierte Darstellung von $\mathfrak{g}$. Derivationen im Bild von ad heißen innere Derivationen.

Manchmal ist es hilfreich ad_g für ad zu schreiben (für eine Diag. Matrix x ist $\text{ad}_{\text{diag}(K)}(x) = 0$, aber i. A. $\text{ad}_{\text{gl}(K)}(x) \neq 0$.)

I.4 Ideale

Def. I.4.1 Sei $\mathfrak{g}$ eine Lie-Algebra über K . Ein **Ideal** in $\mathfrak{g}$ ist ein K -Untervektorraum $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{g}$, sodass für alle $x \in \mathfrak{g}$, $y \in \mathfrak{a}$ gilt $[x, y] \in \mathfrak{a}$.

Notation: $\mathfrak{a} \triangleleft \mathfrak{g}$.

Beispiele. • $\{0\} \subseteq \mathfrak{g}$, $\mathfrak{g} \subseteq \mathfrak{g}$ (trivial).

• Das **Zentrum** $\mathfrak{z}(\mathfrak{g}) = \{z \in \mathfrak{g} : [x, z] = 0 \text{ für alle } x \in \mathfrak{g}\}$.

• Die **derivierte Algebra** $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$ (definiert als $\langle [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}] \rangle_K \subseteq \mathfrak{g} \dots$). Beachte:

• $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}] = 0 \Leftrightarrow \mathfrak{g}$ abelsch

• $[\mathfrak{sl}_n(K), \mathfrak{sl}_n(K)] = \mathfrak{sl}_n(K)$ ($n \neq 2$, falls $2=0$ in K)

Ideale kann man addieren und „multiplizieren“

$$\mathfrak{a} + \mathfrak{b} = \{x + y : x \in \mathfrak{a}, y \in \mathfrak{b}\},$$

$$[\mathfrak{a}, \mathfrak{b}] = \left\{ \sum [x_i, y_i] : x_i \in \mathfrak{a}, y_i \in \mathfrak{b} \right\}$$

und erhält wieder Ideale.

Def. I.4.2 $\mathfrak{g}$ heißt **einfach**, falls $\{0\}$ und $\mathfrak{g}$ die einzigen Ideale von $\mathfrak{g}$ sind und $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}] \neq 0$.

Beachte: $\mathfrak{g}$ einfach $\Rightarrow z(\mathfrak{g}) = \{0\}$, $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}] = \mathfrak{g}$.

Satz I.4.3 $sl_2(K)$ mit $\text{char } K \neq 2$ ist einfach.

Bew. $sl_2(K) = \left\langle \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_x, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}_y, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}_h \right\rangle_K$. Dann

gilt $[h, x] = 2x$, $[h, y] = -2y$, $[x, y] = h$, d.h.

x, y, h ist eine Basis von $\mathfrak{g}$ aus EVec mit EWen $2, -2, 0$ für den Endomorphismus $\text{ad}(h): \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}$.

Sei nun $0 \neq \mathfrak{a} \trianglelefteq \mathfrak{g}$ und $0 \neq z = a \cdot x + b \cdot y + c \cdot h \in \mathfrak{a}$.

Dann gilt $\text{ad}(x)(\text{ad}(x)(z)) = \text{ad}(x)(b \cdot h + 2c \cdot x) = -2bx \in \mathfrak{a}$ und $\text{ad}^2(y)(z) = -2ay \in \mathfrak{a}$.

Falls $a \neq 0$ oder $b \neq 0$ folgt $x \in \mathfrak{a}$ oder $y \in \mathfrak{a}$ ($\text{char } K \neq 2!$) und damit $\mathfrak{a} = \mathfrak{g}$. Falls $a = b = 0$, folgt $h \in \mathfrak{a}$ und damit ebenfalls $\mathfrak{a} = \mathfrak{g}$. $\square$

Def. I.4.4 Sei $\mathfrak{a} \trianglelefteq \mathfrak{g}$. Dann definieren wir die **Faktoralgebra** oder **Quotientenalgebra** von $\mathfrak{g}$ nach $\mathfrak{a}$ als den Faktorraum $\mathfrak{g}/\mathfrak{a}$ mit Klammern $[x + \mathfrak{a}, y + \mathfrak{a}] = [x, y] + \mathfrak{a}$.

Dies ist wohldefiniert, denn für $x - x', y - y' \in \mathfrak{a}$ folgt $[x' + \mathfrak{a}, y' + \mathfrak{a}] = [x', y'] + \mathfrak{a} = [x', y'] + [x - x', y'] - [y - y', x] + \mathfrak{a} = [x', y'] + [x, y'] - [x', y] - [y, x] + [y', x] + \mathfrak{a} = [x, y] + \mathfrak{a}$.

Beachte: Für $\phi: \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}'$ ist $\ker \phi \trianglelefteq \mathfrak{g}$. Umgekehrt:
 Ist $\alpha \trianglelefteq \mathfrak{g}$, so gilt $\alpha = \ker(\mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}/\alpha)$.

Universelle Eigenschaft: Sei $\alpha \trianglelefteq \mathfrak{g}$. Dann gilt für
 $\phi: \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}'$, $\alpha \subseteq \ker \phi$:

□

Prop. I.4.5 a) Für $\phi: \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}'$ gilt $\mathfrak{g}/\ker \phi \xrightarrow{\cong} \text{Bild } \phi$.

b) Seien $\alpha, \beta \trianglelefteq \mathfrak{g}$, $\alpha \subseteq \beta$. Dann gilt
 $\beta/\alpha \trianglelefteq \mathfrak{g}/\alpha$ und $\mathfrak{g}/\alpha / \beta/\alpha \cong \mathfrak{g}/\beta$.

c) Seien $\alpha, \beta \trianglelefteq \mathfrak{g}$. Dann gilt $\alpha + \beta / \alpha \cong \beta / \alpha \cap \beta$. □

Def. I.4.6 Eine **Darstellung** von $\mathfrak{g}$ ist ein
 Homomorphismus $\phi: \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{gl}(V)$.

Wichtiges Beispiel: $\text{ad}: \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{gl}(\mathfrak{g})$. Beachte
 $\ker \text{ad} = \mathfrak{z}(\mathfrak{g})$. Daher: $\mathfrak{g}$ einfach $\Rightarrow \mathfrak{g}$ linear.

(Tatsächlich: $\dim_{\mathbb{K}} \mathfrak{g} < \infty \Rightarrow \mathfrak{g}$ linear [Ado-Iwasawa])

Sei $A \in \mathfrak{g}$. Wir definieren noch den **Normalisator**

$$\mathfrak{n}_{\mathfrak{g}}(A) = \{ x \in \mathfrak{g} : [x, A] \in A \} \subseteq \mathfrak{g}$$

und den **Zentralisator**

$$\mathfrak{z}_{\mathfrak{g}}(A) = \{ x \in \mathfrak{g} : [x, A] = 0 \} \subseteq \mathfrak{g}.$$

Beide sind Unteralgebren nach (L3).

I.5 Automorphismen

Sei char $K=0$. Ist $x \in \mathfrak{g}$ mit $\text{ad } x$ nilpotent (d.h. $(\text{ad } x)^k = 0$ für ein $k > 0$), definieren wir

$$\exp(\text{ad } x) = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(\text{ad } x)^j}{j!}.$$

Prop. I.5.1 Es gilt $\exp(\text{ad } x) \in \text{Aut } \mathfrak{g}$.

Bew. Die Gleichung

$$\exp(\text{ad } x)([y, z]) = [\exp(\text{ad } x)(y), \exp(\text{ad } x)(z)]$$

folgt aus Prop. I.3.4 und der Leibnizregel.

Schreiben wir $\exp(\text{ad } x) = 1 + \eta$, so ist

$$\frac{1}{1+\eta} = 1 - \eta + \eta^2 - \eta^3 \pm \dots \text{ ein Inverses}$$

zu $\exp(\text{ad } x)$. □

Def. I.5.2 Ist $\mathfrak{g} = \langle \exp(\text{ad } x) : \text{ad } (x) \text{ nilpotent} \rangle_{\text{Aut } \mathfrak{g}}$
"innere Automorphismen".

Es gilt $\text{Aut } \mathfrak{g} \stackrel{\text{Normalteiler}}{\trianglelefteq} \text{Aut } \mathfrak{g}$, denn für $\phi \in \text{Aut } \mathfrak{g}$
ist $\phi(\text{ad } x)\phi^{-1} = \text{ad } \phi(x)$, also

$$\phi \exp(\text{ad } x) \phi^{-1} = \exp(\text{ad } \phi(x)) \in \text{Aut } \mathfrak{g}.$$

Beispiel: Ist $K = \bar{K}$, char $K=0$, gilt

- $\text{Aut } \mathfrak{sl}_2(K) = \text{Aut } \mathfrak{sl}_2(K) \cong \text{PSL}_2(K)$
- $\text{Aut } \mathfrak{sl}_3(K) = \text{PSL}_3(K) \rtimes \mathbb{Z}/2$.

(Noch) ohne Beweis.

I.6 Auflösbare Lie-Algebren

Sei $\mathfrak{g}$ eine Lie-Algebra über K .

Def. I.6.1. Die **derivierte Reihe** von $\mathfrak{g}$ ist definiert durch $D^0 \mathfrak{g} = \mathfrak{g}$, $D^{n+1} \mathfrak{g} = [D^n \mathfrak{g}, D^n \mathfrak{g}]$ und $\mathfrak{g}$ heißt **auflösbar**, falls $D^N \mathfrak{g} = 0$ für ein $N \geq 0$.

Beispiel: $\mathfrak{g}$ abelsch, Gegenbeispiel: $\mathfrak{g}$ einfach, z.B. $\mathfrak{sl}_2(K)$ für char $K \neq 2$.

Prop. I.6.2 Die Lie-Algebra $\mathfrak{t}_n(K)$ ist auflösbar.

Bew. Es gilt $D^1 \mathfrak{t}_n(K) = [\mathfrak{t}_n(K), \mathfrak{t}_n(K)] \stackrel{HA}{=} \mathfrak{n}_n(K)$.

Sei $I_{ij} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}_i$. Dann gilt

$$[I_{ij}, I_{kl}] = \delta_{jk} I_{il} - \delta_{il} I_{kj}.$$

Sei also $i < j$, $k < l$ und wegen (L2) o.B.d.A. $i \neq l$.

Dann gilt

$$[I_{ij}, I_{kl}] = \begin{cases} I_{il} & \text{falls } j=k \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

und $l-i = (l-k) + (k-i) \stackrel{j=k}{=} (l-k) + (j-i)$.

Es folgt $D^r \mathfrak{t}_n(K) = \langle I_{ij} : (j-i) \geq 2^{r-1} \rangle_K$

und somit $D^N \mathfrak{t}_n(K) = 0$ für $N \gg 0$. $\square$

Prop. I.6.3 Ist $\mathfrak{g}$ auflösbar, so auch jede Unteralg.

$\mathfrak{h} \leq \mathfrak{g}$ und jeder Quotient $\mathfrak{g}/\mathfrak{a}$ für $\mathfrak{a} \leq \mathfrak{g}$.

Sind $\mathfrak{a} \leq \mathfrak{g}$ und $\mathfrak{g}/\mathfrak{a}$ auflösbar, so auch $\mathfrak{g}$.

Bew. Es gilt $\mathcal{D}^n h \leq \mathcal{D}^n \mathfrak{g}$ (klar) und
 $(\mathcal{D}^n \mathfrak{g})/a \cong \mathcal{D}^n(\mathfrak{g}/a)$ (Induktion nach n , HA!)

$= \phi(\mathcal{D}^n \mathfrak{g})$ für $\phi: \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}/a$. $\square$

Prop. I.6.4 Sind $a, b \trianglelefteq \mathfrak{g}$ auflösbar, so auch $a+b$.

Bew. Es ist $a+b/b \stackrel{\text{I.4.5.c)}}{\cong} a/a \cap b$ auflösbar lt. I.6.3,
 also $a+b$ auflösbar ebenfalls lt. I.6.3. $\square$

Def. I.6.5 Das **auflösbare Radikal** von $\mathfrak{g}$
 ist das eindeutige maximale auflösbare Ideal
 $\text{Rad}(\mathfrak{g}) \trianglelefteq \mathfrak{g}$.

Eindeutig: Seien $a, b \trianglelefteq \mathfrak{g}$ maximal auflösbar.

Dann ist $a+b$ auflösbar lt. I.6.4, also

$a \leq a+b \leq b$ und symmetrisch $b \leq a$, also $a=b$. $\square$

Def. I.6.6 Die Lie-Algebra $\mathfrak{g}$ heißt **halbeinfach**,
 falls $\text{Rad} \mathfrak{g} = \{0\}$.

Bsp.: Ist $\mathfrak{g}$ einfach, so auch halbeinfach, denn wegen

$[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}] = \mathfrak{g}$ ist $\mathfrak{g}$ nicht auflösbar also

$\mathfrak{g} \triangleright \text{Rad}(\mathfrak{g}) = \{0\}$.

• $\mathfrak{g} = \{0\}$ ist halbeinfach, aber nicht einfach.

• Ist $\mathfrak{g}$ beliebig, so ist $\mathfrak{g}/\text{Rad}(\mathfrak{g})$ halbeinfach.
 (HA!)

Mit $\mathfrak{a} = \text{Rad}(\mathfrak{g})$ und $\mathfrak{s} = \mathfrak{g}/\mathfrak{a}$ haben wir eine **kurze exakte Folge**

$$0 \rightarrow \mathfrak{a} \xrightarrow{i} \mathfrak{g} \xrightarrow{p} \mathfrak{s} \rightarrow 0,$$

$\uparrow$ auflösbar $\uparrow$ halbeinfach

d.h. an jeder Stelle gilt Kern (nachfolgender Pfeil) = Bild (vorheriger Pfeil). Mit anderen Worten:

Jede Lie-Algebra ist eine **Erweiterung** einer halbeinfachen durch eine auflösbare Lie-Algebra.

Ist $K = \mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$, **zerfällt** die Erweiterung,

d.h. es gibt einen Homomorphismus $s: \mathfrak{s} \rightarrow \mathfrak{g}$ mit $p \circ s = \text{id}_{\mathfrak{s}}$. In diesem Fall gilt $\mathfrak{g} \cong \mathfrak{a} \rtimes_{\varrho} \mathfrak{s}$

mit $\varrho: \mathfrak{s} \rightarrow \text{Der}(\mathfrak{a})$, $x \mapsto \text{ad}_{\mathfrak{g}}(s(x))|_{\mathfrak{a}}$, wobei das **semidirekte Produkt** $\mathfrak{a} \rtimes_{\varrho} \mathfrak{s}$ für Lie-Algebren $\mathfrak{a}, \mathfrak{s}$ und $\varrho: \mathfrak{s} \rightarrow \text{Der}(\mathfrak{a})$ i.A. definiert ist als der Vektorraum $\mathfrak{a} \oplus \mathfrak{s}$ mit $[a_1 \oplus s_1, a_2 \oplus s_2] = (\varrho(s_1)(a_2) - \varrho(s_2)(a_1) + [a_1, a_2]) \oplus [s_1, s_2]$.

I.7 Nilpotente Lie-Algebren

Sei $\mathfrak{g}$ eine Lie-Algebra über K .

Def. I.7.1 Die **absteigende Zentralreihe** von $\mathfrak{g}$ ist definiert durch $\mathcal{C}^0 \mathfrak{g} = \mathfrak{g}$, $\mathcal{C}^n \mathfrak{g} = [\mathfrak{g}, \mathcal{C}^{n-1} \mathfrak{g}]$ und $\mathfrak{g}$ heißt **nilpotent**, falls $\mathcal{C}^N \mathfrak{g} = \{0\}$ für ein $N \geq 0$.

Offensichtlich: nilpotent $\Rightarrow$ auflösbar.

Beispiel · $\mathfrak{n}_n(K)$ ist nilpotent, denn $\mathcal{C}^2 \mathfrak{n}_n(K) = \langle I_{ij} : j-i \geq 2+1 \rangle_K$.

· $\mathfrak{z}_n(K)$ ist auflösbar, aber nicht nilpotent, denn $D^2(\mathfrak{z}_n(K)) = \mathfrak{n}_n(K)$ für $n \geq 1$.

Prop. I.7.2 (i) Ist $\mathfrak{g}$ nilpotent, so auch $\mathfrak{h} \leq \mathfrak{g}$ und $\mathfrak{g}/\mathfrak{a}$ für $\mathfrak{a} \leq \mathfrak{g}$.

(ii) Ist $\mathfrak{g}/\mathcal{Z}(\mathfrak{g})$ nilpotent, so auch $\mathfrak{g}$.

(iii) Ist $\mathfrak{g}$ nilpotent und $\mathfrak{g} \neq 0$, folgt $\mathcal{Z}(\mathfrak{g}) \neq 0$.

Bew. (i) wie I.6.3. (ii) gilt $\mathcal{C}^N(\mathfrak{g}) \subseteq \mathcal{Z}(\mathfrak{g})$, folgt $\mathcal{C}^{N+1}(\mathfrak{g}) \subseteq [\mathfrak{g}, \mathcal{Z}(\mathfrak{g})] = \{0\}$. (iii) Ist N minimal mit $\mathcal{C}^N(\mathfrak{g}) = \{0\}$, folgt $\{0\} \neq \mathcal{C}^{N-1}(\mathfrak{g}) \subseteq \mathcal{Z}(\mathfrak{g})$. $\square$

Beachte: $\mathfrak{g}$ nilpotent $\Leftrightarrow$ Es gibt ein $N \geq 0$, sodass

$\text{ad}(x_1) \circ \text{ad}(x_2) \circ \dots \circ \text{ad}(x_N)(y) = 0$ für alle $x_1, \dots, x_N, y \in \mathfrak{g}$.

Daraus: $\text{ad}(x)^N = 0$, d.h. alle $x \in \mathfrak{g}$ sind **ad-nilpotent**.

Satz I.7.3 (Engel) Sei $\mathfrak{g}$ eine Lie-Algebra über K ,
sodass jedes $x \in \mathfrak{g}$ ad-nilpotent ist. Dann ist $\mathfrak{g}$
nilpotent.

Der Beweis benötigt etwas Vorbereitung.

Lemma I.7.4 Ist $x \in \mathfrak{gl}(V)$ nilpotent, so auch
ad-nilpotent.

Bew. Betrachte $\lambda_x, \rho_x: \mathfrak{gl}(V) \rightarrow \mathfrak{gl}(V)$

$\lambda_x(y) = xy$, $\rho_x(y) = yx$. Dann kommutieren λ_x und ρ_x
und sind nilpotent, also ist auch $\text{ad}(x) = \lambda_x - \rho_x$
nilpotent. $\square$

Warnung. $\text{id}_H \in \mathfrak{gl}(V)$ ist ad-nilpotent, aber nicht
nilpotent.

Satz I.7.5 Sei $\mathfrak{g} \subseteq \mathfrak{gl}(V)$ mit $0 < \dim_K V < \infty$.

Ist jedes $x \in \mathfrak{g}$ nilpotent, so gibt es ein $0 \neq v \in V$
mit $\mathfrak{g} \cdot v = \{0\}$.

Bew. Induktion nach $\dim \mathfrak{g}$. Klar für $\mathfrak{g} = \{0\}$. Sei nun
 $\mathfrak{h} \subseteq \mathfrak{g}$ maximal. Laut I.7.4 wirkt $\text{ad } h$ durch ad nilpotent
auf $\mathfrak{g}$, also auch auf $\mathfrak{g}/\mathfrak{h}$. Nach I.V. gibt es
 $x + \mathfrak{h} \in \mathfrak{g}/\mathfrak{h}$, $x \notin \mathfrak{h}$, mit $(\text{ad } h) \cdot x \in \mathfrak{h}$, d.h.
 $\mathfrak{h} \subseteq N_{\mathfrak{g}}(h) = \mathfrak{g}$, also $\mathfrak{h} \trianglelefteq \mathfrak{g}$. Dann aber
 $\dim_K \mathfrak{g}/\mathfrak{h} = 1$, denn sonst widerspricht $\mathfrak{p}^{-1}(\mathfrak{h})$ für
 $\mathfrak{h} \subseteq \mathfrak{g}/\mathfrak{h}$ eindim. u. $\mathfrak{g} \twoheadrightarrow \mathfrak{g}/\mathfrak{h}$ die Maximalität von $\mathfrak{h}$.

Wir haben also $\mathfrak{a} \cong \mathfrak{h} \oplus Kx$. Nach I.V. ist $W = \{v \in V : \mathfrak{h} \cdot v = \{0\}\} \neq \{0\}$. Es gilt $\mathfrak{a} \cdot W \subseteq W$, denn für $y \in \mathfrak{h}$, $z \in \mathfrak{a}$ und $w \in W$ gilt

$$yz \cdot w = (zy + \underbrace{[y,z]}_{\in \mathfrak{h}}) \cdot w = 0.$$

Weil $x|_W$ nilpotent, gibt es $0 \neq v \in W$ mit $x \cdot v = 0$, also auch $\mathfrak{a} \cdot v = \{0\}$. $\square$

Bew. von Satz I.7.3. Induktion nach $\dim \mathfrak{a}$. Für $\mathfrak{a} = \{0\}$ trivial. Für $\mathfrak{a} \neq 0$ erfüllt $\text{ad } \mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{a} \cdot \mathfrak{a}$ die Voraussetzungen von I.7.5, also gibt es ein $0 \neq x \in \mathfrak{a}$ mit $\text{ad}(\mathfrak{a})(x) = \{0\}$, d.h. $x \in Z(\mathfrak{a})$. Jedes $x + Z(\mathfrak{a}) \in \mathfrak{a}/Z(\mathfrak{a})$ ist ad -nilpotent und $\dim \mathfrak{a}/Z(\mathfrak{a}) < \dim \mathfrak{a}$, also ist $\mathfrak{a}/Z(\mathfrak{a})$ nilpotent nach I.V. Somit ist $\mathfrak{a}$ nilpotent nach I.7.2.(ii). $\square$

Def. I.7.6 Sei V ein K -Vektorraum. Eine **vollständige Fahne** in V ist eine Folge von Unterräumen $\{0\} = V_0 \subseteq V_1 \subseteq \dots \subseteq V_n = V$ mit $\dim V_i = i$.

Satz I.7.7 Sei $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{gl}(V)$ mit $0 < \dim_K V < \infty$. Ist jedes $x \in \mathfrak{a}$ nilpotent, so gibt es eine vollständige Fahne (V_i) in V , sd. $x \cdot V_i \subseteq V_{i-1}$ für alle $x \in \mathfrak{a}$ und $i=1, \dots, n$.
Äquivalent: es gibt eine Basis von V bzgl. der $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{n}_n(K)$.

Bew. Nach I.7.5 gibt es $V_2 \subseteq V$ 1-dim. mit $\alpha_{\mathfrak{g}} \cdot V_2 \subseteq \{0\} = V_0$. Weil $\alpha_{\mathfrak{g}}$ nilpotent auf V/V_2 wirkt, gibt es nach I.v. eine vollst. Folge (w_i) in V/V_2 mit $\alpha_{\mathfrak{g}} \cdot w_i \subseteq w_{i-2}$. Setze $V_{i+1} = p^{-1}(w_i)$ für $V \xrightarrow{p} V/V_2$ und $i=1, \dots, n-1$. Dann gilt $\alpha_{\mathfrak{g}} \cdot V_i = \alpha_{\mathfrak{g}} \cdot p^{-1}(w_{i-1}) = p^{-1}(\alpha_{\mathfrak{g}} \cdot w_{i-1}) \subseteq p^{-1}(w_{i-2}) = V_{i-1}$ für $i=2, \dots, n+1$. $\square$

Lemma I.7.8 Sei $\alpha_{\mathfrak{g}}$ nilpotent, $0 \neq \mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{g}$.

Dann gilt $\mathfrak{a} \cap \mathfrak{z}(\alpha_{\mathfrak{g}}) \neq \{0\}$.

Bew. Nach I.7.5 gibt es $0 \neq x \in \mathfrak{a}$ mit $\text{ad}(\alpha_{\mathfrak{g}}) \cdot x = \{0\}$ oder äquivalent $\text{ad}_{\mathfrak{g}}(x) = 0$, d.h. $x \in \mathfrak{a} \cap \mathfrak{z}(\alpha_{\mathfrak{g}})$. $\square$

II Strukturtheorie halbeinfacher Lie-Algebren

Fortan sei $\text{char } K = 0$ (d.h. $\mathbb{Q} \subseteq K$) und $K = \bar{K}$
(z.B. $K = \mathbb{Q}$ oder $K = \mathbb{C}$).

I.1 Der Satz von Lie

Satz I.1.1 Sei $\mathfrak{g} \subseteq \mathfrak{gl}(V)$ auflösbar mit $0 < \dim_K V < \infty$.
Dann gibt es einen gemeinsamen Eigenvektor $v \in V$
für alle $x \in \mathfrak{g}$.

Bew. Induktion nach $\dim \mathfrak{g}$. Anfang $\mathfrak{g} = \{0\}$ klar.
Weil $\mathfrak{g}$ auflösbar, ist $\mathfrak{g}/[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}] \neq \{0\}$. Wähle
einen Unterraum $h \leq \mathfrak{g}/[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$ der Kodimension
eins. Dann ist das Urbild $\mathfrak{a}$ von h in $\mathfrak{g}$ ein
Ideal $\mathfrak{a} \leq \mathfrak{g}$ der Kodimension eins. Nach I.V.
gibt es ein $0 \neq v \in V$, das EV für alle $x \in \mathfrak{a}$ ist.
Die EVs bilden eine Linearform $\lambda \in \mathfrak{a}^* = \text{Hom}_K(\mathfrak{a}, K)$,
d.h. $x \cdot v = \lambda(x) \cdot v$ für alle $x \in \mathfrak{a}$. Sei

$$W = \{w \in V : x \cdot w = \lambda(x) \cdot w \text{ für alle } x \in \mathfrak{a}\} \neq \{0\}.$$

Beh.: $\mathfrak{g} \cdot W \subseteq W$. Sobald bewiesen, schreibe
 $\mathfrak{g} = \mathfrak{a} \oplus Kz$ mit $z \in \mathfrak{g} \setminus \mathfrak{a}$ und wähle einen
EV $v_0 \in W$ von z (existiert, weil $K = \bar{K}$!) Dann ist z
ein EV für alle $x \in \mathfrak{g}$.

Nun zum Beweis der Beh. Seien $x \in \mathfrak{g}$, $w \in W$.

z.z. $x \cdot w \in W$, d.h. für alle $y \in \mathfrak{a}$ soll gelten

$y \cdot x \cdot w = \lambda(y) x \cdot w$. Weil $yx \cdot w = (xy - [x, y]) \cdot w =$
 $= \lambda(y) x \cdot w - \lambda([x, y]) \cdot w$, bleibt z.z. $\lambda([x, y]) = 0$.

Sei dazu $w \in W$ und n maximal mit

$w, x \cdot w, \dots, x^{n-1} \cdot w$ linear unabhängig. Setze
 $W_i = \langle w, x \cdot w, \dots, x^{i-1} \cdot w \rangle_K$. Dann gilt $x \cdot W_n \subseteq W_n$

und $y \cdot W_i \subseteq W_i$ für alle i . Bzgl. der Basis
 $w, x \cdot w, \dots, x^{n-1} \cdot w$ von W_n ist $\gamma = \begin{pmatrix} \lambda(y) & * \\ 0 & \ddots \\ & & \lambda(y) \end{pmatrix}$, denn
 $y \cdot x^i w \equiv \lambda(y) \cdot x^i w \pmod{W_i}$

nach Induktion: klar für $i=0$ und

$$y \cdot x^i w = yx \cdot x^{i-1} w = xy \cdot x^{i-1} w - \underbrace{[x, y] \cdot x^{i-1} w}_{\in W_{i-1}}$$

Nach I.V. gilt $y \cdot x^{i-1} w = \lambda(y) \cdot x^{i-1} w + w'$ mit
 $w' \in W_{i-2}$ und $x \cdot w' \in W_i$.

Somit $\text{Spur}_{W_n}(y) = n \cdot \lambda(y)$ für beliebiges $y \in \mathfrak{a}$.

Ersetzen wir y durch $[x, y] \in \mathfrak{a}$, folgt

$$0 = \text{Spur}_{W_n}([x, y]) = n \cdot \lambda([x, y]). \quad \text{Es folgt } \lambda([x, y]) = 0,$$

weil $\text{char } K = 0$. □

Satz II.1.2 (Lie) Sei $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{a}_L(V)$ auflösbar mit $\dim_K V = n < \infty$. Dann gibt es eine vollständige

Fahne (V_i) in V mit $\mathfrak{a} \cdot V_i \subseteq V_i$. Äquivalent:

Es gibt eine Basis von V bzgl. der $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{t}_n(K)$.

Bew. Induktion nach $\dim V$ mit II.1.1. wie im

Beweis von I.7.7. □

Korollar II.1.3 Sei $\mathfrak{g}$ auflösbar. Dann gibt es Ideale $\mathfrak{g}_i \trianglelefteq \mathfrak{g}$ mit $\{0\} = \mathfrak{g}_0 \leq \mathfrak{g}_1 \leq \dots \leq \mathfrak{g}_n = \mathfrak{g}$ und $\dim \mathfrak{g}_i = i$.

Bew. Wende II.1.2 an auf $\text{ad}(\mathfrak{g}) \leq \mathfrak{g}_1 \mathfrak{l}(\mathfrak{g})$ (auflösbar laut I.6.3.). $\square$

Korollar II.1.4 Sei $\mathfrak{g}$ auflösbar. Ist $x \in [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$, so ist $\text{ad}_{\mathfrak{g}}(x)$ nilpotent. Inbes. ist $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$ nilpotent.

Bew. Nach II.1.2 haben wir $\text{ad}(\mathfrak{g}) \leq \mathfrak{t}_n(K)$, also $\text{ad}_{\mathfrak{g}}([\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]) = [\text{ad}(\mathfrak{g}), \text{ad}(\mathfrak{g})] \leq \mathfrak{n}_n(K)$, d.h. $\text{ad}_{\mathfrak{g}}(x)$ ist nilpotent. Damit ist auch $\text{ad}_{[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]}(x) = \text{ad}_{\mathfrak{g}}(x)|_{[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]}$ nilpotent. Mit Satz I.7.3 (Engel) folgt, $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$ ist nilpotent. $\square$

Also ist jede auflösbare Lie-Algebra eine Erweiterung einer abelschen durch eine nilpotente Lie-Algebra:

$$0 \rightarrow [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}] \rightarrow \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}/[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}] \rightarrow 0.$$

II.2 Jordan-Chevalley-Zerlegung

Nur in diesem Abschnitt sei $\text{char } K$ beliebig.

Def. II.2.1 Sei V ein endl.-dim. K -VR. Dann heißt $x \in \text{End } V$ **halbeinfach**, falls x diagonalisierbar ist

(über $k = \bar{k}$).

Prop. II.2.2 Sei $x \in \text{End } V$.

(i) Es gibt eindeutige $x_s, x_n \in \text{End } V$, sd. x_s halbeinfach, x_n nilpotent, $x = x_s + x_n$ und $[x_s, x_n] = 0$.

(ii) Es gilt $x_s = p(x)$ und $x_n = q(x)$ für gewisse $p, q \in k[X]$ mit $p(0) = q(0) = 0$.

Wir nennen $x = x_s + x_n$ die **Jordan(-Chevalley)-Zerlegung**.

Bew. Sei $\prod_i (X - a_i)^{m_i}$ das char. Poly. von x .

Nach chinesischem Restsatz gibt es $p \in k[X]$ mit $p \equiv a_i \pmod{(X - a_i)^{m_i}}$ für alle i und $p \equiv 0 \pmod{X}$.

Setze $q(X) = X - p(X)$, $x_s = p(x)$, $x_n = q(x)$.

Dann gilt für $v \in \ker (x - a_i)^{m_i}$, dass $x_s \cdot v = a_i \cdot v$,

also ist x_s halbeinfach und $x_n = x - x_s$ ist nilpotent, wie man auf einer Jordan-Basis nachprüft.

Ist $x = x'_s + x'_n$ eine weitere Jordan-Zerlegung,

gilt $x_s - x'_s = x'_n - x_n$. Weil $[x_s, x'_s] = [x'_n, x_n] = 0$

sind beide Seiten halbeinfach und nilpotent, also null. $\square$

Lemma II.2.3 Sei $x \in \text{End } V$. Dann ist

$\text{ad } x = \text{ad}(x_s) + \text{ad}(x_n)$ die Jordan-Zerlegung von $\text{ad } x$.

Bew. Wie in HA 1.3 sehen wir, dass für $\gamma \in \text{End } V$ halbeinfach mit EWe $a_1, \dots, a_n$ der Endomorphismus $\text{ad } \gamma \in \text{End}(\text{End } V)$ die EWe $a_i - a_j$ zu den EWe I_{ij} hat. Also ist $\text{ad } \gamma$ ebenfalls halbeinfach. Somit ist $\text{ad } x_s$ halbeinfach, $\text{ad } x_n$ nilpotent (I.7.4) und $[\text{ad } x_s, \text{ad } x_n] = \text{ad}([x_s, x_n]) = \text{ad}(0) = 0$ und die Beh. folgt aus II.2.2.(i). $\square$

Lemma II.2.4 Sei $\mathcal{A}$ eine endl.-dim. K -Algebra. Dann gilt für alle $\delta \in \text{Der } \mathcal{A}$, dass $\delta_s, \delta_n \in \text{Der } \mathcal{A}$.

Bew. Es genügt zu zeigen, dass $\sigma = \delta_s \in \text{Der } \mathcal{A}$.

Sei $\mathcal{A} = \bigoplus_a \mathcal{A}_a$ die Hauptraumzerlegung von δ (= Eigenraumzerlegung von σ). Dann gilt

$\mathcal{A}_a \mathcal{A}_b \subseteq \mathcal{A}_{a+b}$, weil

$$(\delta - (a+b) \cdot \text{id})^n(xy) = \sum_{i=0}^n ((\delta - a \cdot \text{id})^{n-i} x) ((\delta - b \cdot \text{id})^i y)$$

(Induktion nach n). Es folgt $\sigma(xy) = (a+b) \cdot xy$,

aber auch $(\sigma x)y + x\sigma(y) = a \cdot xy + x(b \cdot y) = (a+b) \cdot xy$

für alle $x \in \mathcal{A}_a, y \in \mathcal{A}_b$. Daher $\sigma \in \text{Der } \mathcal{A}$. $\square$

II.3 Killing-Form und Cartan-Kriterien

Suchen Kriterien für die Auflösbarkeit von $\mathfrak{g}$
(äquivalent: die Nilpotenz von $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$.)

Prop. II.3.1 Seien $A \subseteq B \subseteq \mathfrak{gl}(V)$ und

$$M = \{x \in \mathfrak{gl}(V) : [x, B] \subseteq A\}.$$

Angenommen $x \in M$ erfülle $\text{Spur}(xy) = 0$ für alle $y \in M$. Dann ist x nilpotent.

Bew. Sei $x = s + n$ die Jordan-Zerlegung (z.z. $s = 0$).

Fixiere Jordan-Basis bzgl. der $s = \text{Diag}(a_1, \dots, a_n)$.

Sei $E = \langle a_1, \dots, a_n \rangle_{\mathbb{Q}} \subseteq K$ (z.z. $E = 0 \Leftrightarrow E^* = 0$)

zu $f \in E^*$ sei $y \in \mathfrak{gl}(V)$ mit Matrixdarstellung $\text{Diag}(f(a_1), \dots, f(a_n))$ bzgl. der Jordan-Basis.

Wie oben gesehen gilt $\text{ad}_s(I_{ij}) = (a_i - a_j) \cdot I_{ij}$

und $\text{ad}_y(I_{ij}) = (f(a_i) - f(a_j)) \cdot I_{ij}$. Wähle

$r(x) \in K[x]$ mit $r(a_i - a_j) = f(a_i) - f(a_j)$ und

$r(0) = 0$ (Bed. wohldefiniert, denn $a_i - a_j = a_2 - a_1$

impliziert $f(a_i) - f(a_j) = f(a_i - a_j) = f(a_2) - f(a_1)$.)

Nach Konstruktion haben wir $\text{ad}_y = r(\text{ad}_s)$.

Laut Lemma II.2.3 ist $\text{ad}_s = (\text{ad}_x)_s$. Daher

gibt es nach Prop. II.2.2.(ii) ein $p \in K[x]$ mit

$p(0) = 0$ und $\text{ad}_s = p(\text{ad}_x)$, d.h. $r \circ p(\text{ad}_x) =$

$= \text{ad}_y$. Weil nach Vor. $\text{ad}_x \cdot B \subseteq A$, folgt auch

$\text{ad}_y \cdot B \subseteq A$, d.h. $y \in M$. Nach Vor. folgt

$\text{Spur}(xy) = 0 \Leftrightarrow \sum_i a_i f(a_i) = 0$. Weil $f \in \text{Hom}(E, \mathbb{Q})$

gibt Anzeichen vor f , dass $\sum_i f(a_i)^2 = 0$, d.h. $f(a_i) = 0$

für alle i und somit $f = 0$. $\square$

Lemma II.3.2 Für $x, y, z \in \text{End } V$ gilt

$$\text{Spur}([x, y]z) = \text{Spur}(x[y, z]).$$

Bew. $\text{Spur}(xyz - yxz) = \text{Spur}(xyz) - \text{Spur}(yxz)$
 $= \text{Spur}(x(yz - zy)). \quad \square$

Satz II.3.3 (Cartan-Kriterium für Auflösbarkeit)

Sei $\mathfrak{g} \leq \mathfrak{gl}(V)$, sodass $\text{Spur}(xy) = 0$ für alle $x \in [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$ und $y \in \mathfrak{g}$. Dann ist $\mathfrak{g}$ auflösbar.

Bew. Wende II.3.1 an mit $A = [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$ und $B = \mathfrak{g}$ (sodass $\mathfrak{g} \subseteq M$). Haben $\text{Spur}(xy) = 0$ für $x \in [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}], y \in \mathfrak{g}$. Beachte $\text{Spur}(xy) = 0$ für $x \in [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}], y \in M$. Sei dazu $x = [u, v]$ (ein Erzeuger). Dann gilt nach II.3.2, dass $\text{Spur}([u, v]y) = \text{Spur}(u[v, y]) = \text{Spur}([v, y]u) = 0$, weil $y \in M$. Wir dürfen nun schließen, dass x nilpotent ist. Also ist $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$ nilpotent nach Satz I.7.7. $\square$

Korollar I.3.4 Sei $\mathfrak{g}$ eine Lie-Algebra, sodass $\text{Spur}(\text{ad } x \text{ ad } y) = 0$ für alle $x \in [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}], y \in \mathfrak{g}$. Dann ist $\mathfrak{g}$ auflösbar.

Bew. Es ist $\text{ad } \mathfrak{g}$ auflösbar nach II.3.3, also $\mathfrak{g}$ auflösbar nach I.6.3. $\square$

Def. II.3.5 Sei $\mathfrak{g}$ eine Lie-Algebra. Die Killing-Form von $\mathfrak{g}$ ist die symmetrische Bilinearform

$$B_{\mathfrak{g}} = B: \mathfrak{g} \times \mathfrak{g} \rightarrow K \\ (x, y) \mapsto \text{Spur}(\text{ad } x \text{ ad } y).$$

Nach II.3.2 ist B „assoziativ“: $B([x, y], z) = B(x, [y, z])$.

Lemma II.3.6. Sei $\mathfrak{a} \trianglelefteq \mathfrak{g}$. Dann gilt $B_{\mathfrak{a}} = B_{\mathfrak{g}}|_{\mathfrak{a} \times \mathfrak{a}}$.

Bew. Beobachtung: Für $\phi: V \rightarrow V$ mit $\phi(V) \subseteq W \subseteq V$ gilt

$$\text{Spur } \phi = \text{Spur}(\phi|_W).$$

$$\begin{aligned} (\text{ad } x)(\text{ad } y)(\mathfrak{g}) &\subseteq \mathfrak{a}, \text{ also } \text{Spur}(\text{ad } x \text{ ad } y) = \\ &= \text{Spur}((\text{ad } x \text{ ad } y)|_{\mathfrak{a}}) = \text{Spur}((\text{ad } x)|_{\mathfrak{a}} (\text{ad } y)|_{\mathfrak{a}}) = \\ &= \text{Spur}(\text{ad}_{\mathfrak{a}} x \text{ ad}_{\mathfrak{a}} y). \quad \square \end{aligned}$$

Beispiel $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}_2 K = \langle x, h, y \rangle$

$$\rightarrow \text{ad } x = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ ad } h = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}, \text{ ad } y = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow B \text{ hat Matrix } \begin{pmatrix} 0 & 0 & 4 \\ 0 & 8 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ mit Determinante } -128.$$

Also ist B nicht ausgeartet (char $K \neq 2$), d.h.

$$\text{Rad } B = \{x \in \mathfrak{g} : B(x, y) = 0 \text{ für alle } y \in \mathfrak{g}\} = \{0\}.$$

Beobachtung: $\text{Rad } B \trianglelefteq \mathfrak{g}$ (wg. „Assoziativität“ von B)

Satz II.3.7 (Cartan-Kriterium für Halbeinfachheit)

Eine Lie-Algebra ist genau dann halbeinfach, wenn ihre Killing-Form nicht ausgeartet ist.

Bew. Sei zuerst $\text{Rad } \mathfrak{g} = \{0\}$. Es gilt nach Def. $B(x, y) = 0$ für alle $x \in \text{Rad } \mathfrak{B}$, $y \in \mathfrak{g}$. Insbes. folgt mit II.3.6 und II.3.4, dass $\text{Rad } \mathfrak{B} \trianglelefteq \mathfrak{g}$ auflösbar ist, d.h. $\text{Rad } \mathfrak{B} \leq \text{Rad } \mathfrak{g} = \{0\}$ und $\mathfrak{B}$ ist nicht ausgeartet.

Sei nun $\text{Rad } \mathfrak{B} = \{0\}$. Es genügt zu zeigen, dass $\mathfrak{a} \leq \text{Rad } \mathfrak{B}$ für jedes abelsche Ideal $\mathfrak{a} \trianglelefteq \mathfrak{g}$.

Sei dazu $x \in \mathfrak{a}$, $y \in \mathfrak{g}$. Dann haben wir

$$\mathfrak{g} \xrightarrow{\text{ad } y} \mathfrak{g} \xrightarrow{\text{ad } x} \mathfrak{a} \xrightarrow{\text{ad } y} \mathfrak{a} \xrightarrow{\text{ad } x} \{0\},$$

also $(\text{ad } x \text{ ad } y)^2 = 0$, d.h. $(\text{ad } x \text{ ad } y)$ ist nilpotent und somit $\text{Spur}(\text{ad } x \text{ ad } y) = 0$, also $x \in \text{Rad } \mathfrak{B}$. $\square$

II.4 Zerlegung in einfache Ideale

Für $A \trianglelefteq \mathfrak{g}$ sei $A^\perp = \{x \in \mathfrak{g} : B(x, a) = 0 \text{ für alle } a \in A\}$.

Prop. II.4.1 Sei $\mathfrak{g}$ halbeinfach und $\mathfrak{a} \trianglelefteq \mathfrak{g}$. Dann gilt

$$\mathfrak{g} \cong \mathfrak{a} \oplus \mathfrak{a}^\perp$$

mit $\mathfrak{a}^\perp \trianglelefteq \mathfrak{g}$ und $\mathfrak{a}, \mathfrak{a}^\perp$ sind halbeinfach.

Bew. Es ist $\mathfrak{a}^\perp \trianglelefteq \mathfrak{g}$, denn für $x \in \mathfrak{a}^\perp$, $y \in \mathfrak{g}$, $z \in \mathfrak{a}$ gilt $B([x, y], z) = B(x, [y, z]) = 0$. Dies zeigt außerdem nach II.3.4, dass $\mathfrak{a} \cap \mathfrak{a}^\perp$ auflösbar, also trivial ist. Weil $\{0\} = \mathfrak{a} \cap \mathfrak{a}^\perp = \text{Rad}(B|_{\mathfrak{a} \times \mathfrak{a}}) \stackrel{\text{II.3.6}}{=} \text{Rad}(B_{\mathfrak{a}})$, ist $\mathfrak{a}$ halbeinfach laut II.3.7.

Damit ist auch $\mathfrak{a}^\perp$ halbeinfach. Weil $B_{\mathfrak{a}}$ nicht ausg., gibt es zu $x \in \mathfrak{g}$ ein $a \in \mathfrak{a}$ mit $B(x, a') = B(a, a')$ für alle $a' \in \mathfrak{a}$, also $x - a \in \mathfrak{a}^\perp$. Somit $\mathfrak{g} \cong \mathfrak{a} \oplus \mathfrak{a}^\perp$. $\square$

Beachte: Kann immer $\mathfrak{g} \cong \mathfrak{a} \oplus \mathfrak{b}$ mit $\mathfrak{a}, \mathfrak{b} \trianglelefteq \mathfrak{g}$, folgt für $a \in \mathfrak{a}$, $b \in \mathfrak{b}$, dass $[a, b] \in \mathfrak{a} \cap \mathfrak{b}$, also $[a, b] = 0$. Außerdem gilt $\mathfrak{a} \perp \mathfrak{b}$ bzgl. B , d.h. $B_{\mathfrak{g}} = B_{\mathfrak{a}} \oplus B_{\mathfrak{b}}$ nach II.3.6.

Satz II.4.2 Eine Lie-Algebra $\mathfrak{g}$ ist genau dann halbeinfach, wenn sie sich eindeutig in einfache Ideale zerlegt:

$$\mathfrak{g} \cong \mathfrak{g}_1 \oplus \dots \oplus \mathfrak{g}_t.$$

Bew. Haben wir eine solche Zerlegung, ist $B_{\mathfrak{g}}$ orthogonale Summe nicht ausgearteter Formen, also selbst nicht ausgeartet, somit ist $\mathfrak{g}$ halbeinfach laut II.3.7.

Ist $\mathfrak{g}$ halbeinfach, wähle $\{0\} \neq \mathfrak{a} \trianglelefteq \mathfrak{g}$ minimal und erhalte $\mathfrak{g} \cong \mathfrak{a} \oplus \mathfrak{a}^\perp$ wie in II.4.1. Dann aber

folgt für $b \trianglelefteq \mathfrak{a}$, dass auch $b \trianglelefteq \mathfrak{g}$, also ist $\mathfrak{a}$ einfach. Weil $\mathfrak{a}^\perp$ halbeinfach, zerfällt es induktiv in eine direkte Summe einfacher Ideale, die auch Ideale in $\mathfrak{g}$ sind. Eindeutigkeit: Ist $\mathfrak{a} \trianglelefteq \mathfrak{g}$ einfach, folgt wegen $[\mathfrak{a}, \mathfrak{g}] \trianglelefteq \mathfrak{a}$, dass $[\mathfrak{a}, \mathfrak{g}] = \mathfrak{a}$, weil $Z(\mathfrak{g}) = \{0\}$. Daher $\mathfrak{a} = [\mathfrak{a}, \mathfrak{g}] = \bigoplus_i [\mathfrak{a}, \mathfrak{g}_i]$, d.h. $\mathfrak{a} = \mathfrak{g}_i$. $\square$

Korollar II.4.3 Für $\mathfrak{g}$ halbeinfach gilt:

(i) $\mathfrak{g} = [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$,

(ii) Jedes $\mathfrak{a} \trianglelefteq \mathfrak{g}$ ist direkte Summe einfacher Ideale von $\mathfrak{g}$.

Bew. (i) folgt durch Einsetzen der Zerlegung.

(ii) Nach II.4.1 ist $\mathfrak{a} \trianglelefteq \mathfrak{g}$ halbeinfach, nach II.4.2 zerfällt $\mathfrak{a}$ in einfache Ideale und diese sind auch Ideale in $\mathfrak{g}$. $\square$

II.5 Abstrakte Jordan-Zerlegung

Lemma II.5.1. Sei $\mathfrak{g}$ eine Lie-Algebra. Dann gilt $\text{ad } \mathfrak{g} \trianglelefteq \mathcal{D}\mathfrak{g}$.

Bew. Für $x, y \in \mathfrak{g}$ und $\delta \in \mathcal{D}\mathfrak{g}$ gilt

$$[\delta, \text{ad } x](y) = \delta([x, y]) - [x, \delta(y)] = [\delta x, y] = \text{ad}(\delta x)(y). \quad (*) \quad \square$$

Satz II.5.2 Für $\mathfrak{g}$ halbeinfach gilt $\text{ad } \mathfrak{g} = \text{Der } \mathfrak{g}$.

Bew. Nach II.3.7 hat $\text{ad } \mathfrak{g} \cong \mathfrak{g}$ nicht ausgeartete Killing-Form. Nach II.3.6 und II.5.1 gilt

$B_{\text{ad } \mathfrak{g}} = B_{\text{Der } \mathfrak{g}} |_{\text{ad } \mathfrak{g} \times \text{ad } \mathfrak{g}}$. Wie zuvor folgt $\text{ad } \mathfrak{g} \cap (\text{ad } \mathfrak{g})^\perp = \{0\}$ und $[\text{ad } \mathfrak{g}, (\text{ad } \mathfrak{g})^\perp] = \{0\}$. Für $\delta \in (\text{ad } \mathfrak{g})^\perp$ folgt aus (*) $\text{ad}(\delta x) = 0$ für alle $x \in \mathfrak{g}$, also $\delta = 0$. $\square$

Mit Lemma II.2.4 folgt also für $\mathfrak{g}$ halbeinfach und $x \in \mathfrak{g}$, dass $\text{ad } x = (\text{ad } x)_s + (\text{ad } x)_n$ mit $(\text{ad } x)_s, (\text{ad } x)_n \in \text{ad } \mathfrak{g}$!

Def. II.5.3 Sei $\mathfrak{g}$ halbeinfach und $x \in \mathfrak{g}$. Dann ist

$$x = x_s + x_n$$

die eindeutige **Jordan-Zerlegung** von x , wobei

$x_s, x_n \in \mathfrak{g}$ eindeutig bestimmt sind durch

$$\text{ad}(x_s) = (\text{ad } x)_s \quad \text{und} \quad \text{ad}(x_n) = (\text{ad } x)_n.$$

Beachte: • x_s ist ad-halbeinfach,

• x_n ist ad-nilpotent,

• $[x_s, x_n] = 0$.

• Falls $\mathfrak{g} \subseteq \mathfrak{gl}(V)$, stimmt dies mit der Jordan-Zerlegung als Endomorphismen überein (Beweis in Abschnitt II.7.)

II.6 Vollständige Reduzibilität von Darstellungen

Sei $\mathfrak{g}$ halbeinfach. Erinnerung: Eine Darstellung von $\mathfrak{g}$ ist ein Homomorphismus $\mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}_L(V)$ (I.4.6).
Äquivalent: V ist ein $\mathfrak{g}$ -Modul, d.h.

$$(M1) \quad (ax + by) \cdot v = a \cdot (x \cdot v) + b \cdot (y \cdot v)$$

$$(M2) \quad x \cdot (av + bw) = a \cdot (x \cdot v) + b \cdot (x \cdot w)$$

$$(M3) \quad [x, y] \cdot v = x \cdot y \cdot v - y \cdot x \cdot v$$

für alle $x, y \in \mathfrak{g}$, $v, w \in V$, $a, b \in K$.

- Ein $\mathfrak{g}$ -Homomorphismus von $\mathfrak{g}$ -Moduln $\phi: V \rightarrow W$ erfüllt $\phi(x \cdot v) = x \cdot \phi(v)$ für alle $v \in V$, $x \in \mathfrak{g}$.
- $\text{Ker } \phi$, $\text{Bild } \phi$ sind $\mathfrak{g}$ -Untermodule und $V / \text{Ker } \phi \cong \text{Bild } \phi$ u.s.w.
- V heißt $\mathfrak{g}$ -irreduzibel, falls V genau zwei $\mathfrak{g}$ -invariante Unterräume hat ($\{0\}$ und V).
- V heißt $\mathfrak{g}$ -vollständig reduzibel, falls $V \cong V_1 \oplus \dots \oplus V_t$ mit V_i irreduzibel. (Äquivalent: jeder Untermodul $W \subseteq V$ ist komplementiert, d.h. $V \cong W \oplus W'$ für einen Untermodul $W' \subseteq V$.)

Satz II.6.1 (Weyl) Sei $\mathfrak{g}$ halbeinfach. Dann ist jede Darstellung $\phi: \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}_L(V)$ vollständig reduzibel.

Dabei ist $\dim_K V < \infty$ (wie immer) implizit.

Beweis. Für $\phi = \text{ad}$ ist dies die Aussage von Satz II.4.2. Im Allgemeinen nutze Weyls **unitären Trick** (für $k = \mathbb{C}$): Es gibt eine kompakte, einfach zusammenhängende Lie-Gruppe U mit $\text{Lie}(U) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \cong \mathfrak{g}$ (z. B. Beispiel I.2. (iv)). $\phi|_{\text{Lie}(U)}$ stiftet $\Phi: U \rightarrow \text{GL}(V)$. Wähle eine hermitesche Form $\langle \cdot, \cdot \rangle_0$ auf V und setze $\langle v, w \rangle = \int_U \langle g \cdot v, g \cdot w \rangle_0 d\mu_U(g)$ für das Haar-Maß μ_U auf U mit $\mu_U(U) = 1$. Ist $w \in V$ ϕ -invariant, so auch Φ -invariant. Damit ist $w^\perp$ ein Φ -invariantes Komplement, denn für $v \in w^\perp$, $g \in U$, $w \in w$ gilt $\langle g \cdot v, w \rangle = \langle v, \underbrace{g^{-1} \cdot w}_{\in w} \rangle = 0$, und $w^\perp$ ist auch ϕ -invariant. $\square$

II.7 Erhalt der Jordan-Zerlegung

Satz II.7.1 Sei $\mathfrak{g} \subseteq \mathfrak{gl}(V)$ halbeinfach und $x \in \mathfrak{g}$. Dann enthält $\mathfrak{g}$ den halbeinfachen und nilpotenten Teil von x als Endomorphismus.

Korollar II.7.2 Abstrakte und gewöhnliche Jordan-Zerlegung von $x \in \mathfrak{g} \subseteq \mathfrak{gl}(V)$ halbeinfach stimmen überein.

Bew. Sei $x = x_s + x_n$ die gewöhnliche Jordan-Zerlegung. Dann ist nach II.2.3 $\text{ad}_{\mathfrak{gl}(V)} x = \text{ad}_{\mathfrak{gl}(V)}(x_s) + \text{ad}_{\mathfrak{gl}(V)}(x_n)$ die

Jordan-Zerlegung von $\text{ad}_{\mathfrak{gl}(V)} x$. Nach II.7.1 gilt $x_s, x_n \in \mathfrak{g}$ und weil Halb Einfachheit und Nilpotenz unter Einschränkung auf invariante Unterräume erhalten bleibt, ist $\text{ad}_{\mathfrak{g}}(x) = \text{ad}_{\mathfrak{g}}(x_s) + \text{ad}_{\mathfrak{g}}(x_n)$ die gewöhnliche Jordan-Zerlegung in $\mathfrak{gl}(\mathfrak{g})$. $\square$

Bew. (von II.7.1) Sei $x = x_s + x_n$ die gewöhnliche Jordan-Zerlegung in $\mathfrak{gl}(V)$. z.z.: $x_s, x_n \in \mathfrak{g}$.

Weil $(\text{ad}_{\mathfrak{gl}(V)} x)(\mathfrak{g}) \subseteq \mathfrak{g}$, folgt aus II.2.2. (ii), dass auch $(\text{ad}_{\mathfrak{gl}(V)} x_n)(\mathfrak{g}) \subseteq \mathfrak{g}$ und $(\text{ad}_{\mathfrak{gl}(V)} x_s)(\mathfrak{g}) \subseteq \mathfrak{g}$, d.h.

$x_s, x_n \in \mathfrak{n}_{\mathfrak{gl}(V)}(\mathfrak{g})$. Für einen Untermodul $W \subseteq V$ sei

$$\mathfrak{g}_W = \{ y \in \mathfrak{gl}(V) : y \cdot W \subseteq W \text{ und } \text{Spur}(y|_W) = 0 \}$$

(z.B. $\mathfrak{g}_V = \mathfrak{sl}(V)$). Weil $\mathfrak{g} = [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$, gilt $\mathfrak{g} \subseteq \bigcap_W \mathfrak{g}_W = \mathfrak{g}'$.

Beobachtung: $x_s, x_n \in \mathfrak{g}'$. Es genügt also z.z. $\mathfrak{g}' = \mathfrak{g}$.

Nach II.6.1 gilt $\mathfrak{g}' = \mathfrak{g} \oplus \mathfrak{g}^\perp$ ($\mathfrak{g}'$ ist $\mathfrak{g}$ -Modul via ad , weil $\mathfrak{g} \subseteq \mathfrak{n}_{\mathfrak{gl}(V)}(\mathfrak{g}_W)$ für alle $W \subseteq V$.)

Sei nun $y \in \mathfrak{g}^\perp$. Dann gilt $[x, y] = 0$ für alle $x \in \mathfrak{g}$ und damit für jeden irreduziblen $W \subseteq V$, dass $y|_W = \lambda \cdot \text{id}_W$ nach Lemma von Schur (s.u.). Andererseits $\text{Spur}(y|_W) = 0$, weil $y \in \mathfrak{g}_W$, also $\lambda = 0$, d.h. $y|_W = 0$.

Wegen II.6.1 folgt $y = 0$. $\square$

Lemma I.7.3 (Schur) Sei $\phi: \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{gl}(V)$ irreduzibel und $\gamma \in \mathfrak{gl}(V)$ mit $[\phi(x), \gamma] = 0$ für alle $x \in \mathfrak{g}$. Dann gibt es $\lambda \in K$ mit $\gamma = \lambda \cdot \text{id}_V$.

Bew. Weil $K = \bar{K}$, besitzt γ einen EV $v_0 \in V$ mit EW $\lambda \in K$. Setze $\gamma' = \gamma - \lambda \cdot \text{id}_V$. Dann ist $W = \ker \gamma' \subseteq V$ ein Untermodul, weil für $v \in W$ und $x \in \mathfrak{g}$ auch $\gamma'(x \cdot v) = (\gamma' \cdot x) \cdot v = (x \cdot \gamma') \cdot v = x \cdot (\gamma' \cdot v) = x \cdot 0 = 0$. Weil $v_0 \in W$ und W irreduzibel, folgt $W = V$. $\square$

Satz II.7.4 Sei $\phi: \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{gl}(V)$ eine Darstellung mit $\mathfrak{g}$ halbeinfach. Für $x \in \mathfrak{g}$ sei $x = x_s + x_n$ die (abstrakte) Jordan-Zerlegung in $\mathfrak{g}$. Dann ist $\phi(x) = \phi(x_s) + \phi(x_n)$ die (gewöhnliche) Jordan-Zerlegung in $\mathfrak{gl}(V)$.

Bew. Sei $\{x_i\} \subseteq \mathfrak{g}$ eine Basis aus EVen für $\text{ad } x_s$, d.h. $[x_s, x_i] = \lambda_i x_i$. Dann folgt $[\phi(x_s), \phi(x_i)] = \lambda_i \phi(x_i)$, d.h. $\phi(\mathfrak{g})$ wird von EVen von $\text{ad}_{\phi(\mathfrak{g})}(\phi(x_s))$ erzeugt, also ist $\text{ad}_{\phi(\mathfrak{g})}(\phi(x_s))$ halbeinfach. Außerdem gilt $\text{ad}_{\phi(\mathfrak{g})}(\phi(x_n))^k(\phi(x)) = \phi((\text{ad}_{\mathfrak{g}} x_n)^k(x)) = 0$ für $k \gg 0$ und alle $x \in \mathfrak{g}$, d.h. $\text{ad}_{\phi(\mathfrak{g})}(\phi(x_n))$ ist nilpotent. Damit ist $\phi(x) = \phi(x_s) + \phi(x_n)$ die abstrakte Jordan-Zerlegung in $\phi(\mathfrak{g})$. Nach I.7.2 ist es auch die gewöhnliche Jordan-Zerlegung. $\square$

II.8 Darstellungstheorie von $sl_2(K)$.

In diesem Abschnitt betrachten wir $sl_2(K) = \langle x, h, y \rangle_K$.

Sei V ein $sl_2(K)$ -Modul. Wegen II.7.4 zerfällt V in Eigenräume von h :

$$V \cong \bigoplus_{\lambda \in K} V_\lambda \quad \text{mit} \quad V_\lambda = \{v \in V : h \cdot v = \lambda v\},$$

wobei alle EWs $\lambda \in K$, weil $K = \bar{K}$. Gilt $V_\lambda \neq \{0\}$,

nennen wir λ ein **Gewicht** von h in V und

V_λ heißt **Gewichtsraum**.

Lemma II.8.1 Für $v \in V_\lambda$ gilt $x \cdot v \in V_{\lambda+2}$ und $y \cdot v \in V_{\lambda-2}$.

Bew. $h \cdot (x \cdot v) = (h \cdot x) \cdot v = ([h, x] + x \cdot h) \cdot v = (2x + x \cdot h) \cdot v = (2x + \lambda x) \cdot v = (2 + \lambda) \cdot (x \cdot v)$ und ähnlich für y . $\square$

Bemerkung. Insbesondere sind $x, y \in \text{End } V$ nilpotent, wie wir es auch schon aus dem vorherigen Abschnitt wissen.

• Für $\lambda \in K$ mit $V_\lambda \neq \{0\}$ und $V_{\lambda+2} = \{0\}$ nennen wir jedes $0 \neq v \in V_\lambda$ einen Vektor mit **höchstem Gewicht λ** .

Sei nun V irreduzibel und $v_0 \in V_\lambda$ mit höchstem Gewicht.

Setze $v_{-2} = 0$ und $v_i = \frac{1}{i!} (y \cdot)^i v_0$ für $i \geq 0$ (char $K = 0$).

Lemma II.8.2. (a) $h \cdot v_i = (\lambda - 2i) \cdot v_i$.

(b) $y \cdot v_i = (i + 1) \cdot v_{i+1}$.

(c) $x \cdot v_i = (\lambda - i + 1) \cdot v_{i-1}$.

Bew. (a) und (b) klar. (c):

$$\begin{aligned}i \cdot x \cdot v_i &= x \cdot \gamma \cdot v_{i-2} = ([x, \gamma] + \gamma \cdot x) \cdot v_{i-2} = \\&= h \cdot v_{i-2} + \gamma \cdot x \cdot v_{i-2} \stackrel{(a)+I.V.}{=} (\lambda - 2(i-1)) v_{i-2} \\&\quad + (\lambda - (i-1) + 1) \cdot \gamma \cdot v_{i-2} = (\lambda - 2i + 2) v_{i-2} + (\lambda - i + 2) \gamma \cdot v_{i-2} \\&\stackrel{(b)}{=} (\lambda - 2i + 2) v_{i-2} + (\lambda - i + 2)(i-1) \cdot v_{i-2} = \\&= i(\lambda - i + 1) \cdot v_{i-2}. \quad \square\end{aligned}$$

Beobachtungen:

- Wegen (a) sind alle $v_i \neq 0$ linear unabhängig.
- Weil $\dim_K V < \infty$ gibt es m minimal mit $v_m \neq 0$ und $v_{m+2} = 0$, also auch $v_{m+i} = 0$ für $i \geq 1$.
- Sonst ist $\{0\} \neq \langle v_0, v_2, \dots, v_m \rangle_K \subseteq V$ ein $\mathfrak{g}$ -Untermodul, also $\langle v_0, v_2, \dots, v_m \rangle_K = V$, weil V irr.
- Bzgl. der Basis $v_0, \dots, v_m$ gilt $h \in \mathfrak{d}_{m+2}(K)$, $x \in \mathfrak{n}_{m+2}(K)$, $\gamma \in \mathfrak{n}_{m+2}(K)^T$.
- Für $i = m+1$ sagt (c) $0 = (\lambda - m) \cdot v_m$, also gilt $\lambda = m = \dim V - 1 \in \mathbb{Z}_{20}$.
- Wegen (a) gilt $\dim V_\lambda = 1$, falls $V_\lambda \neq \{0\}$.
- Insbesondere ist der Vektor höchsten Gewichts, ($= \dim V - 1$) bis auf Skalare eindeutig.

Satz II.8.3 Sei V ein irreduzibler $sl_2(K)$ -Modul und $m = \dim V - 1$. Dann gilt:

- (a) $V \cong V_m \oplus V_{m-2} \oplus \dots \oplus V_{-m+2} \oplus V_{-m}$ (K -VR-Summe, wobei jedes V_μ eindim. Gewichtsraum von $\mathfrak{h}$)
- (b) V hat einen (bis auf Skalare) eindeutigen Vektor mit höchstem Gewicht m .
- (c) Die Wirkung von x, h, y auf V ist durch II.8.2 nach geeigneter Basiswahl eindeutig und explizit bestimmt. Insbesondere gibt es (bis auf Iso.) genau einen irr. $sl_2(K)$ -Modul in jeder Dimension ≥ 1 .

Bew. Es fehlt nur noch die Existenz in (c). Doch diese folgt, indem wir den $sl_2(K)$ -Modul

$V = \langle v_0, \dots, v_m \rangle$ durch II.8.2. (a), (b), (c) definieren

(HA 5.1!) □

Mit II.6.1 (Weyl) verstehen wir auch allgemeine $sl_2(K)$ -Modulen:

Korollar II.8.4. Ist V ein $sl_2(K)$ -Modul, so sind alle EWe von $\mathfrak{h}$ ganzzahlig und treten zusammen mit ihrem Negativen gleich oft auf. Die Anzahl irr. Untermodulen von V ist $\dim V_0 + \dim V_1$. □

II.9 Wurzelraumzerlegung

In diesem Abschnitt ist $\{0\} \neq \mathfrak{g}$ halbeinfach.

Def. II.9.1 Eine Unteralgebra $\mathfrak{t} \leq \mathfrak{g}$ heißt **torisch**, falls jedes $x \in \mathfrak{t}$ halbeinfach ist (d.h. $x = x_s$).

Beobachtung. Wäre jedes $x \in \mathfrak{g}$ nilpotent (d.h. $x = x_n$), so wäre $\mathfrak{g}$ nach I.7.3 (Engel) nilpotent. Also gibt es $x \in \mathfrak{g}$ mit $x = x_s + x_n$ und $x_s \neq 0$, d.h. $\langle x_s \rangle_K \leq \mathfrak{g}$ ist torisch. Also gibt es immer $\mathfrak{t} \leq \mathfrak{g}$ nicht-trivial torisch.

Lemma II.9.2 Jede torische Unteralgebra $\mathfrak{t} \leq \mathfrak{g}$ ist abelsch.

Bew. z.z.: Für alle $x \in \mathfrak{t}$ ist null einziger EW von $\text{ad}_{\mathfrak{t}}(x)$.

Angenommen $[x, y] = a \cdot y$ mit $0 \neq y \in \mathfrak{t}$ und $0 \neq a \in K$.

Schreibe $x = \sum_i \lambda_i x_i$ in einer Basis aus EVen von $\text{ad}_{\mathfrak{t}}(y)$ (mit EWen μ_i). Dann gilt $-a \cdot y = \text{ad}_{\mathfrak{t}}(y)(x) = \sum_i \lambda_i \mu_i x_i$, d.h. $\lambda_i \mu_i \neq 0$ für ein i . Aber $\text{ad}_{\mathfrak{t}}(y)(-a \cdot y) = 0$, d.h. $-a \cdot y$ ist EV von $\text{ad}_{\mathfrak{t}}(y)$ zum EW null, Widerspruch. $\square$

Def. II.9.3 Eine **Cartan-Unteralgebra (CSA)** ist eine maximale torische Unteralgebra $\mathfrak{h} \leq \mathfrak{g}$.

Achtung: Diese Def. ist nur unter unseren Annahmen ($\mathfrak{g}$ halbeinfach, $\text{char } K = 0$, $K = \bar{K}$) äquivalent zur eigentlichen Definition: $\mathfrak{h} \leq \mathfrak{g}$ nilpotent und $\pi_{\mathfrak{g}}(\mathfrak{h}) = \mathfrak{h}$.

Beispiel. Die Diagonalmatrizen in $sl_n(K)$ bilden eine CSA $\mathfrak{h} \subseteq sl_n(K)$. Allgemeiner in Typ A_n, B_n, C_n, D_n (HA 5.2).

Sei nun $\mathfrak{h} \subseteq \mathfrak{g}$ eine CSA. Dann besteht die Familie $\{\text{ad}_{\mathfrak{g}}(h) : h \in \mathfrak{h}\}$ aus kommutierenden Endomorphismen, denn

$$[h_2, [h_2, x]] = -[x, \underbrace{[h_2, h_2]}_{=0 \text{ (II.9.2)}}] - [h_2, [x, h_2]] = [h_2, [h_2, x]].$$

Also sind alle $\text{ad}_{\mathfrak{g}}(h)$ für $h \in \mathfrak{h}$ gleichzeitig diag.-bar:

$$\mathfrak{g} \cong \bigoplus_{\alpha \in \mathfrak{h}^*} \mathfrak{g}_{\alpha}$$

mit $\mathfrak{g}_{\alpha} = \{x \in \mathfrak{g} : [h, x] = \alpha(h) \cdot x \text{ für alle } h \in \mathfrak{h}\}$.

Dabei gilt $\mathfrak{g}_0 = \mathfrak{z}_{\mathfrak{g}}(\mathfrak{h}) \stackrel{\text{II.9.2}}{\supseteq} \mathfrak{h}$.

Def. II.9.4 Wir nennen $0 \neq \alpha \in \mathfrak{h}^*$ eine **Wurzel** von $\mathfrak{g}$ bzgl. $\mathfrak{h}$, falls $\mathfrak{g}_{\alpha} \neq \{0\}$. Die Menge $\Phi \subseteq \mathfrak{h}^*$ aller Wurzeln nennen wir das **Wurzelsystem** von $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$. Für $\alpha \in \Phi$ heißt $\mathfrak{g}_{\alpha}$ der **Wurzelraum** der Wurzel α . Wir haben somit die **Wurzelraumzerlegung** (oder **Cartan-Zerlegung**)

$$\mathfrak{g} \cong \mathfrak{z}_{\mathfrak{g}}(\mathfrak{h}) \oplus \bigoplus_{\alpha \in \Phi} \mathfrak{g}_{\alpha}.$$

Offensichtlich gilt $|\Phi| < \infty$.

- Nächste Ziele:
- Zeige $\mathfrak{z}_{\mathfrak{g}}(h) = h$ und $B|_{h \times h}$ nicht ausg.
 - Finde möglichst viele Eigenschaften von $\mathfrak{I} \subseteq h^* \cong_B h$.
 - Definiere entsprechend **abstrakte Wurzelsysteme**.
 - Klassifiziere abstr. Wurzelsysteme (durch **Dynkin-Diagramme**).
 - Zeige $\{\mathfrak{g} \text{ halb einfach}\} \cong \xleftrightarrow{2:1} \{\text{abstr. Wurzelsysteme}\} \cong$.

Prop. II.9.5. (i) Für $\alpha, \beta \in h^*$ gilt $[\mathfrak{g}_{\alpha}, \mathfrak{g}_{\beta}] \subseteq \mathfrak{g}_{\alpha+\beta}$.

(ii) Für $0 \neq \alpha \in h^*$ ist jedes $x \in \mathfrak{g}_{\alpha}$ (ad-)nilpotent.

(iii) Seien $\alpha, \beta \in h^*$ mit $\alpha + \beta \neq 0$. Dann ist $\mathfrak{g}_{\alpha} \perp \mathfrak{g}_{\beta}$ bzgl. B.

Bew. (i) Seien $x \in \mathfrak{g}_{\alpha}, y \in \mathfrak{g}_{\beta}, h \in h$. Dann gilt

$$[h, [x, y]] = -[y, [h, x]] - [x, [y, h]] = -[y, \alpha(h) \cdot x]$$

$$- [x, -\beta(h) \cdot y] = \alpha(h)[x, y] + \beta(h)[x, y] = (\alpha + \beta)(h) \cdot [x, y]$$

(ii) Folgt aus (i).

(iii) Sei $h \in h$ mit $(\alpha + \beta)(h) \neq 0$, $x \in \mathfrak{g}_{\alpha}, y \in \mathfrak{g}_{\beta}$.

Dann gilt

$$B(x, y) = \frac{1}{(\alpha + \beta)(h)} (B(\alpha(h) \cdot x, y) + B(x, \beta(h) \cdot y))$$

$$= \frac{1}{(\alpha + \beta)(h)} (B([h, x], y) + B(x, [h, y])) = 0. \quad \square$$

Prop. II.9.6 $B|_{\mathfrak{z}_{\mathfrak{g}}(h) \times \mathfrak{z}_{\mathfrak{g}}(h)}$ ist nicht ausgeartet.

Bew. Nach II.3.7 ist B nicht ausgeartet. Nach II.9.5

gilt $\mathfrak{z}_{\mathfrak{g}}(h) = \mathfrak{g}_0 \perp \mathfrak{g}_{\alpha}$ für alle $0 \neq \alpha \in h^*$. Gilt

also für $x \in \mathfrak{z}_{\mathfrak{g}}(h)$, dass $B(x, \mathfrak{z}_{\mathfrak{g}}(h)) = 0$, folgt $x = 0$. $\square$

Lemma II.9.7 Für $x, y \in \mathfrak{gl}(V)$ mit y nilpotent und $[x, y] = 0$ ist xy nilpotent und $\text{imbes. } \text{Spur}(xy) = 0$. $\square$

Satz II.9.8 Sei $\mathfrak{h} \subseteq \mathfrak{g}$ eine CSA. Dann gilt $\mathfrak{z}_{\mathfrak{g}}(\mathfrak{h}) = \mathfrak{h}$.

Bew. Setze $\mathfrak{z} := \mathfrak{z}_{\mathfrak{g}}(\mathfrak{h})$. Wir arbeiten Schritt für Schritt:

1.) $x \in \mathfrak{z} \Rightarrow x_s, x_n \in \mathfrak{z}$: z.z.: $\text{ad}(x_{s/n})(\mathfrak{h}) = \{0\}$.

Wiel $\text{ad } x(\mathfrak{h}) = \{0\}$, folgt aus II.2.2.(ii), dass $(\text{ad } x)_{s/n}(\mathfrak{h}) = \{0\}$. Aber $(\text{ad } x)_{s/n} = \text{ad}(x_{s/n})$.

2.) $x \in \mathfrak{z}$ halbeinfach $\Rightarrow x \in \mathfrak{h}$: $\mathfrak{h} + \mathbb{K} \cdot x$ ist torisch, weil $[\mathfrak{h}, x] = 0$.
Da $\mathfrak{h}$ maximal torisch, folgt $x \in \mathfrak{h}$.

3.) $B|_{\mathfrak{h} \times \mathfrak{h}}$ ist nicht ausgeartet: Sei $h \in \mathfrak{h}$ mit $B(h, h) = 0$.

Ist $x \in \mathfrak{z}$ nilpotent, gilt $B(x, h) = 0$ nach II.9.7.

Dann aber auch $B(x, h) = 0$ für alle $x \in \mathfrak{z}$ wegen 1.) und 2.). Aus II.2.6 folgt $h = 0$.

4.) $\mathfrak{z}$ ist nilpotent: Ist $x \in \mathfrak{z}$ halbeinfach, folgt $x \in \mathfrak{h}$ aus 2.) und somit ist $\text{ad}_{\mathfrak{z}}(x) = 0$ nilpotent.

Ist $x \in \mathfrak{z}$ nilpotent, so auch $\text{ad}_{\mathfrak{z}}(x) = \text{ad}_{\mathfrak{g}}(x)|_{\mathfrak{z}}$.

Ist $x \in \mathfrak{z}$ beliebig, haben wir $x = x_s + x_n$ mit $x_s, x_n \in \mathfrak{z}$ laut 1.). Weil $[x_s, x_n] = 0$, ist also $\text{ad}_{\mathfrak{z}}(x)$ nilpotent.

Mit I.7.3 (Engel) ist $\mathfrak{z}$ nilpotent.

5.) $\mathfrak{h} \cap [\mathfrak{z}, \mathfrak{z}] = \{0\}$: Folgt wegen $B(\mathfrak{h}, [\mathfrak{z}, \mathfrak{z}]) = B([\mathfrak{h}, \mathfrak{z}], \mathfrak{z}) = B(\{0\}, \mathfrak{z}) = \{0\}$ aus 3.).

6.) $\mathfrak{z}$ ist abelsch. Weil $\mathfrak{z}$ laut 4.) nilpotent, gilt mit $[\mathfrak{z}, \mathfrak{z}] \neq \{0\}$ auch $[\mathfrak{z}, \mathfrak{z}] \cap \mathfrak{z}(\mathfrak{z}) \neq \{0\}$ laut I.7.8. Sei also $0 \neq z \in [\mathfrak{z}, \mathfrak{z}] \cap \mathfrak{z}(\mathfrak{z})$. Nach 2.) und 5.) ist z nicht halbeinfach, d.h. $0 \neq z_n \in \mathfrak{z}$ nach 1.), also $z_n \in \mathfrak{z}(\mathfrak{z})$ mit $\text{ad}(z)(z) = 0$ und weil $\text{ad}(z_n) = (\text{ad}(z))_n = p(\text{ad}(z))$ für ein Polynom $p \in K[X]$ mit $p(0) = 0$ laut Prop. I.2.2.(ii). Aber dann folgt aus I.9.7, dass $B(z_n, z') = 0$ für alle $z' \in \mathfrak{z}$ im Widerspruch zu I.9.6.

7.) $\mathfrak{z} = \mathfrak{h}$. Angenommen, es gäbe $z \in \mathfrak{z} \setminus \mathfrak{h}$. Wegen 1.) und 2.) ist dann $0 \neq z_n \in \mathfrak{z}$. Wegen 6.) und I.9.7 gilt dann $B(z_n, \mathfrak{z}) = 0$ wieder im Widerspruch zu I.9.6. $\square$

Korollar II.9.9. $B|_{\mathfrak{h} \times \mathfrak{h}}$ ist nicht ausgeartet. $\square$

Somit erhalten wir $\mathfrak{h}^* \xrightarrow{\cong} \mathfrak{h}$, $\alpha \mapsto t_\alpha$, wobei $t_\alpha \in \mathfrak{h}$ eindeutig bestimmt ist durch $B(t_\alpha, h) = \alpha(h)$ für alle $h \in \mathfrak{h}$. Insbesondere haben wir die endliche Menge $\{t_\alpha : \alpha \in \Phi\} \subseteq \mathfrak{h}$.

III Wurzelsysteme

Sei $\mathfrak{g}$ halbeinfach mit CSA $\mathfrak{h} \subseteq \mathfrak{g}$ und Wurzelsystem $\Phi = \Phi(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$.

III.1 Eigenschaften der Wurzelraumzerlegung

Satz III.1.1 Sei $\alpha \in \Phi$. Dann gilt

(i) $K \cdot \Phi = \mathfrak{h}^*$.

(ii) $-\alpha \in \Phi$.

(iii) Für $x \in \mathfrak{g}_\alpha$, $y \in \mathfrak{g}_{-\alpha}$ gilt $[x, y] = B(x, y)t_\alpha$.

(iv) $[\mathfrak{g}_\alpha, \mathfrak{g}_{-\alpha}] = K \cdot t_\alpha$.

(v) $\alpha(t_\alpha) = B(t_\alpha, t_\alpha) \neq 0$.

(vi) Zu $0 \neq x_\alpha \in \mathfrak{g}_\alpha$ gibt es $y_\alpha \in \mathfrak{g}_{-\alpha}$, sodass

$$\langle x_\alpha, h_\alpha, y_\alpha \rangle_K \xrightarrow{\cong} \mathfrak{sl}_2 K$$

$$x_\alpha \mapsto \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad h_\alpha \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad y_\alpha \mapsto \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

mit $h_\alpha = [x_\alpha, y_\alpha]$.

(vii) $h_\alpha = \frac{2}{B(t_\alpha, t_\alpha)} \cdot t_\alpha$, $h_{-\alpha} = -h_\alpha$.

Bew. (i) LA: $K \cdot \Phi = \mathfrak{h}^* \Leftrightarrow \bigcap_{\alpha \in \Phi} \ker \alpha = \{0\}$. Falls (i)

nicht gilt, gibt es also $0 \neq h \in \mathfrak{h}$ mit $\alpha(h) = 0$ für alle $\alpha \in \Phi$. Dann folgt aber $\{0\} = [\mathfrak{h}, \mathfrak{h} \oplus \bigoplus_{\alpha \in \Phi} \mathfrak{g}_\alpha] = [\mathfrak{h}, \mathfrak{g}]$, d.h. $h \in \mathfrak{z}(\mathfrak{g}) = \{0\}$, Widerspruch.

(ii) I.9.5.(iii) sagt $B(\mathfrak{g}_\alpha, \mathfrak{g}_\beta) = 0$ für alle $-\alpha \neq \beta \in \mathfrak{h}^*$. Weil $\mathfrak{g}_\alpha \neq \{0\}$, impliziert II.3.7, dass $\mathfrak{g}_{-\alpha} \neq \{0\}$.

(iii) Für alle $h \in \mathfrak{h}$ gilt

$$\begin{aligned} B(h, [x, y]) &= B([h, x], y) = B(\alpha(h) \cdot x, y) \\ &= B(t_\alpha, h) \cdot B(x, y) = B(B(x, y)t_\alpha, h) \\ &= B(h, B(x, y)t_\alpha), \end{aligned}$$

also $B(x, y)t_\alpha - [x, y] \in \text{Rad } B|_{\mathfrak{h} \times \mathfrak{h}} \stackrel{\text{II.9.9}}{=} \{0\}$.

(iv) Nach (iii) bleibt z.z. $B|_{\mathfrak{g}_\alpha \times \mathfrak{g}_{-\alpha}} \neq 0$.

Aber das haben wir bei (ii) gerade gesehen.

(v) Wie eben finden wir $x \in \mathfrak{g}_\alpha, y \in \mathfrak{g}_{-\alpha}$ mit $B(x, y) = 1$, also $[x, y] = t_\alpha$ laut (iii). Wäre $\alpha(t_\alpha) = 0$, gilt $[t_\alpha, x] = [t_\alpha, y] = 0$, also ist $\langle x, y, t_\alpha \rangle_{\mathfrak{K}} = \mathfrak{s} \cong \text{ad}_{\mathfrak{g}}(\mathfrak{s}) \subseteq \mathfrak{gl}(\mathfrak{g})$ auflösbar.

Nach II.1.2 (die) ist $\text{ad}_{\mathfrak{g}}(t_\alpha)$ nilpotent, weil $t_\alpha \in [\mathfrak{s}, \mathfrak{s}]$.

Wiel $t_\alpha \in \mathfrak{h}$, ist $\text{ad}_{\mathfrak{g}}(t_\alpha)$ aber auch halbeinfach, also $\text{ad}_{\mathfrak{g}}(t_\alpha) = 0$, d.h. $t_\alpha \in \mathbb{Z}(\mathfrak{g}) = \{0\}$, Widerspruch.

(vi) Zu $0 \neq x_\alpha \in \mathfrak{g}_\alpha$ wähle $y_\alpha \in \mathfrak{g}_{-\alpha}$ mit

$$\begin{aligned} B(x_\alpha, y_\alpha) &= \frac{2}{B(t_\alpha, t_\alpha)}. \text{ Dann gilt nach (iii) } h_\alpha = [x_\alpha, y_\alpha] \\ &= B(x_\alpha, y_\alpha) \cdot t_\alpha = \frac{2}{B(t_\alpha, t_\alpha)} \cdot t_\alpha. \text{ Außerdem folgt } [h_\alpha, x_\alpha] \\ &= \alpha(h_\alpha) x_\alpha = 2x_\alpha \text{ und } [h_\alpha, y_\alpha] = -\alpha(h_\alpha) y_\alpha = -2y_\alpha. \end{aligned}$$

(vii) $\alpha(h_\alpha) = 2$ forciert $h_\alpha = \frac{2t_\alpha}{B(t_\alpha, t_\alpha)}$. $t_{-\alpha}$ ist definiert durch $B(t_{-\alpha}, h) = -\alpha(h)$ für alle $h \in \mathfrak{h}$, d.h. $B(-t_{-\alpha}, h) = \alpha(h)$ für alle $h \in \mathfrak{h}$, also $t_\alpha = -t_{-\alpha}$. Es folgt $h_{-\alpha} = -h_\alpha$. $\square$

Zu $\alpha \in \Phi$ sei nun $\mathfrak{sl}_2^\alpha \subseteq \mathfrak{g}$ konstruiert wie in (vi).

Wir betrachten nun die Darstellung $\text{ad}_g: \mathfrak{sl}_2^\alpha \rightarrow \mathfrak{gl}(\mathfrak{g})$.
 Zunächst der Untermodul $V = \mathfrak{h} \oplus \bigoplus_{c \in K^*} \mathfrak{g}_{c\alpha}$ (vgl. II.2.5.(i)).
 Dieser hat die Gewichte 0 und $c \cdot \alpha$ (h_α) = $2c$ für
 alle $c \in K^*$ mit $\mathfrak{g}_{c\alpha} \neq \{0\}$. Wegen II.8.4 folgt
 $c \in \frac{1}{2}\mathbb{Z} \subseteq K$. Es gilt $V_0 = \mathfrak{h}$ und $\text{ad}_{\mathfrak{sl}_2^\alpha} \cdot \ker \alpha = \{0\}$,
 d.h. $\ker \alpha \subseteq \mathfrak{h} \subseteq V$ ist ein trivialer Untermodul, der
 in $\dim \mathfrak{h} - 1$ irreduzible ein-dim. Untermodulen zerfällt.
 Außerdem ist $\mathfrak{sl}_2^\alpha \subseteq V$ ein irr. Untermodul mit
 $\mathfrak{sl}_2^\alpha \cap \mathfrak{h} = K \cdot h_\alpha$ und $h_\alpha \notin \ker \alpha$. Damit sind $-2, 0, 2$
 die einzigen geraden Gewichte in V . Somit $\ker \alpha \in \Phi$.
 Weil $\alpha \in \Phi$ beliebig war, folgt dann aber
 auch $\frac{\alpha}{2} \in \Phi$, d.h. 1 ist kein Gewicht von V .
 Damit folgt aus II.8.4, dass $V = \ker \alpha \oplus \mathfrak{sl}_2^\alpha$
 und deshalb $\dim \mathfrak{g}_\alpha = 1$ und $\pm \alpha$ sind die einzigen
 Vielfachen von α in Φ . Zusammenfassung:

Satz III.1.2. (i) Für $\alpha \in \Phi$ gilt $\dim \mathfrak{g}_\alpha = 1$ und
 $\mathfrak{sl}_2^\alpha \cong \mathfrak{g}_\alpha \oplus \mathfrak{g}_{-\alpha} \oplus \mathfrak{h}_\alpha$ mit $h_\alpha = [\mathfrak{g}_\alpha, \mathfrak{g}_{-\alpha}]$.

Zu $0 \neq x_\alpha \in \mathfrak{g}_\alpha$ gibt es $y_\alpha \in \mathfrak{g}_{-\alpha}$ eindeutig mit
 $[x_\alpha, y_\alpha] = h_\alpha (= \frac{2t_\alpha}{B(t_\alpha, t_\alpha)})$.

(ii) Gilt $\alpha \in \Phi$ und $c \cdot \alpha \in \Phi$ für $c \in K^*$, so folgt $c = \pm 1$. $\square$

Wir betrachten nun die Wirkung von $\mathfrak{sl}_2^\alpha$ auf $\mathfrak{g}_\beta$
 für $\beta \in \Phi$ mit $\beta \neq \pm \alpha$.

Sei dazu jetzt $V = \bigoplus_{i \in \mathbb{Z}} \mathfrak{g}_{\beta+i\alpha}$. Nach II.9.5. (i) ist dies wieder ein $\mathfrak{sl}_2^k$ -Modul mit Gewichten

$(\beta+i\alpha)(h_\alpha) = \frac{\beta(h_\alpha)}{\in \mathbb{Z}} + 2i \in \mathbb{Z}$ und undim. Gewichtsräumen. Weil $\dim_K V_0 \oplus V_1 = 1$, ist V irreduzibel (II.8.4). Das höchste bzw. niedrigste Gewicht ist $\beta(h_\alpha) + 2q$ bzw. $\beta(h_\alpha) - 2r$, wenn q bzw. r die größte ganze Zahl ist, für die $\beta + q \cdot \alpha \in \Phi$ bzw. $\beta - r \cdot \alpha \in \Phi$. Wegen II.8.3 gilt dann $\beta + i \cdot \alpha \in \Phi$ für alle $-r \leq i \leq q$ und $\beta(h_\alpha) + 2q = -(\beta(h_\alpha) - 2r)$, also $\beta(h_\alpha) = r - q$, der „Linksübershang“ der α -Kette durch β :

Wir nennen $(\beta(h_\alpha))_{\alpha, \beta \in \Phi}$ die Cartan-Zahlen von Φ .

Zusammenfassung:

Satz III.1.3 (i) Für $\alpha, \beta \in \Phi$ ist $\beta(h_\alpha) \in \mathbb{Z}$ und $\beta - \beta(h_\alpha) \cdot \alpha \in \Phi$.

(ii) Für $\alpha, \beta, \alpha + \beta \in \Phi$ gilt $[\mathfrak{g}_\alpha, \mathfrak{g}_\beta] = \mathfrak{g}_{\alpha+\beta}$.

(iii) Für $\alpha, \beta \in \Phi$, $\beta \neq \pm\alpha$ seien $r, q \in \mathbb{Z}$ maximal mit $\beta - r\alpha, \beta + q\alpha \in \Phi$. Dann gilt $\beta + i\alpha \in \Phi$ für alle $-r \leq i \leq q$ und $\beta(h_\alpha) = r - q$.

(iv) Die Wurzelräume $\mathfrak{g}_\alpha$ für $\alpha \in \Phi$ erzeugen $\mathfrak{g}$. $\square$

III.2 Geometrie des Wurzelsystems

Für $\alpha, \beta \in \mathfrak{h}^*$ setze $(\alpha, \beta) = B(t_\alpha, t_\beta)$. Wegen III.1.1.(i) gibt es eine Basis $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ von $\mathfrak{h}^*$ aus Wurzeln $\alpha_i \in \Phi$.

Prop. III.2.1 Für $\beta \in \Phi$ sei $\beta = \sum_{i=1}^n c_i \alpha_i$ mit $c_i \in K$.

Dann gilt $c_i \in \mathbb{Q} \subseteq K$ für alle $i = 1, \dots, n$.

Beweis. Anwenden von $\frac{2(\cdot, \alpha_j)}{(\alpha_j, \alpha_j)}$ liefert das LGS

$$\underbrace{\frac{2(\beta, \alpha_j)}{(\alpha_j, \alpha_j)}}_{\beta(h_{\alpha_j}) = b_j \in \mathbb{Z}} = \sum_{i=1}^n \underbrace{\frac{2(\alpha_i, \alpha_j)}{(\alpha_j, \alpha_j)}}_{=\alpha_i(h_{\alpha_j}) = a_{ij} \in \mathbb{Z} \text{ (III.1.3.(i))}} \cdot c_i \Leftrightarrow A \cdot c = b$$

mit $A = (a_{ij})^T$, $c = (c_1, \dots, c_n)^T \in K^n$, $b = (b_1, \dots, b_n)^T \in \mathbb{Z}^n$ und $A \in \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{Z})$. Es gilt $\det_K A = \left(\prod_{j=1}^n \frac{2}{(\alpha_j, \alpha_j)} \right) \det_K ((\alpha_i, \alpha_j)) \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, weil D nicht ausgeartet ist. Also hat das LGS eine eindeutige Lösung $c \in \mathbb{Q}^n$. $\square$

Für $E_{\mathbb{Q}} = \mathbb{Q}\Phi \subseteq \mathfrak{h}^*$ folgt somit $\dim_{\mathbb{Q}} E_{\mathbb{Q}} = n$.

Außerdem gilt für $\lambda, \mu \in \mathfrak{h}^*$, dass

$$(\lambda, \mu) = B(t_\lambda, t_\mu) = \sum_{\alpha \in \Phi} \alpha(t_\lambda) \cdot \alpha(t_\mu) = \sum_{\alpha \in \Phi} (\alpha, \lambda) \cdot (\alpha, \mu).$$

Inbesondere

$$(\beta, \beta) = \sum_{\alpha \in \Phi} (\alpha, \beta)^2 \Leftrightarrow \frac{1}{(\beta, \beta)} = \sum_{\alpha \in \Phi} \left(\frac{(\alpha, \beta)}{(\beta, \beta)} \right)^2 \in \mathbb{Q}$$

für $\beta \in \Phi$, d.h. $(\beta, \beta) \in \mathbb{Q}$, weil $\frac{2(\alpha, \beta)}{(\beta, \beta)} \in \mathbb{Z}$, also

auch $(\alpha, \beta) \in \mathbb{Q}$. Daher ist $B|_{E_{\mathbb{Q}}}$ eine nicht ausgeartete symm. $\mathbb{Q}$ -Bilinearform. Für $\lambda \in E_{\mathbb{Q}}$ gilt

$(1, 1) = \sum_{\alpha \in \Phi} (\alpha, 1)^2 > 0 \Leftrightarrow 1 \neq 0$, also ist $(\cdot, \cdot)$ positiv definit.
 Deshalb wird $E = \mathbb{R} \otimes_{\mathbb{Q}} E_{\mathbb{Q}}$ durch $B|_{E_{\mathbb{Q}}} \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{R}$ zu
 einem euklidischen Raum. Somit:

Satz III.2.2 (i) $E \cong \mathbb{R}\Phi$, $0 \notin \Phi$.

(ii) Sei $\alpha \in \Phi$ und $c \in \mathbb{R}$. Dann gilt $c \cdot \alpha \in \Phi \Leftrightarrow c = \pm 1$.

(iii) Für $\alpha, \beta \in \Phi$ ist $\beta - \frac{2(\beta, \alpha)}{(\alpha, \alpha)} \cdot \alpha \in \Phi$.

(iv) Für $\alpha, \beta \in \Phi$ ist $\frac{2(\beta, \alpha)}{(\alpha, \alpha)} \in \mathbb{Z}$. □

III.3 Abstrakte Wurzelsysteme

Setze $\langle \beta, \alpha \rangle = \frac{2(\beta, \alpha)}{(\alpha, \alpha)}$. Beobachtung: $\sigma_{\alpha}(\beta) = \beta - \langle \beta, \alpha \rangle \alpha$
 ist die **Reflexion** in der Ebene von E mit Normale α .

Def. III.3.1 Sei E ein euklidischer Raum. Eine
 endliche Teilmenge $\Phi \subset E$ heißt **(abstraktes, reduziertes)**
Wurzelsystem, falls

(W1) $E \cong \mathbb{R} \cdot \Phi$, $0 \notin \Phi$.

(W2) Sei $\alpha \in \Phi$. Die einzigen Vielfachen von α in Φ sind $\pm \alpha$.

(W3) Für $\alpha \in \Phi$ gilt $\sigma_{\alpha}(\Phi) \subseteq \Phi$.

(W4) Für $\alpha, \beta \in \Phi$ gilt $\langle \beta, \alpha \rangle \in \mathbb{Z}$.

Der **Rang** von Φ ist $n = \dim_{\mathbb{R}} E$.

Def. III.3.2 Die **Wegl-Gruppe** von Φ ist

$$\mathcal{W} = \langle \sigma_{\alpha} : \alpha \in \Phi \rangle \subset GL(E).$$

Wegen (W3) und (W1) ist $\mathcal{W}$ endlich.

Beispiele.

Rang 1: $A_1:$

$$V \cong \mathbb{Z}/2.$$

Rang 2: $A_1 \times A_1:$

$$V \cong \mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}/2.$$

$A_2:$

$$V \cong S_3.$$

$B_2:$

$$V \cong (\mathbb{Z}/2)^2 \times \mathbb{Z}/2.$$

$G_2:$

$$V \cong D_6.$$

Rang 3:

A_3 :

$$\mathcal{H} \cong S_4$$

B_3 :

$$\mathcal{H} \cong (\mathbb{Z}/2)^3 \rtimes S_3$$

C_3 :

$$\mathcal{H} \cong (\mathbb{Z}/2)^3 \rtimes S_3$$

Def. III.3.3 Ein **Morphismus** von Wurzelsystemen $(E, \Phi) \rightarrow (E', \Phi')$ ist eine $\mathbb{R}$ -lineare Abb. $f: E \rightarrow E'$ mit $f(\Phi) \subseteq \Phi'$ und $\langle f(\beta), f(\alpha) \rangle = \langle \beta, \alpha \rangle$.

Darmit sind auch Isomorphismen und Automorphismen definiert. Beachte: $\sigma_{f(\alpha)}(f(\beta)) = f(\beta) - \langle f(\alpha), f(\beta) \rangle \cdot f(\alpha) = f(\beta - \langle \alpha, \beta \rangle \cdot \alpha) = f(\sigma_\alpha(\beta))$. Ist f ein Iso., ist also $\mathcal{W}(\Phi) \rightarrow \mathcal{W}(\Phi')$, $\sigma \mapsto f \circ \sigma \circ f^{-1}$ ein Iso. von Gruppen.

Vier haben eine Inklusion $\mathcal{W}(\Phi) \subseteq \text{Aut } \Phi$ (Dualität braucht Nachweis!). HA: $\mathcal{W}(\Phi) \trianglelefteq \text{Aut } \Phi$.

Es gilt

$$\langle \beta, \alpha \rangle = \frac{2(\beta, \alpha)}{(\alpha, \alpha)} = 2 \frac{\|\beta\|}{\|\alpha\|} \cdot \cos \theta \quad \text{mit } \theta = \angle(\beta, \alpha),$$

also

$$\underbrace{\langle \beta, \alpha \rangle}_{\in \mathbb{Z}} \cdot \underbrace{\langle \alpha, \beta \rangle}_{\in \mathbb{Z}} = 4 \cos^2 \theta \in \{0, 1, 2, 3, 4\} \quad (\text{w4})$$

Es bleiben nur folgende Möglichkeiten, falls $\beta \neq \pm \alpha$, $\|\beta\| \geq \|\alpha\|$:

$\langle \alpha, \beta \rangle$	$\langle \beta, \alpha \rangle$	θ	$\ \beta\ /\ \alpha\ $
0	0	$\pi/2$	—
1	1	$\pi/3$	1
-1	-1	$2\pi/3$	1
1	2	$\pi/4$	$\sqrt{2}$
-1	-2	$3\pi/4$	$\sqrt{2}$

1	3	$\pi/6$	$\sqrt{3}$
-1	-3	$5\pi/6$	$\sqrt{3}$

Beobachtung. Falls $(\alpha, \beta) > 0$, ist $\alpha - \beta \in \Phi$.

Def. III.3.4 Eine **Basis** von (E, Φ) ist eine Teilmenge $\Delta \subset \Phi$, sd:

(i) Δ ist eine Basis von E .

(ii) Für jedes $\alpha \in \Phi$ gilt $\alpha = \sum_{\beta \in \Delta} \lambda_{\beta} \cdot \beta$, sodass entweder $\lambda_{\beta} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ für alle $\beta \in \Delta$ oder $\lambda_{\beta} \in \mathbb{Z}_{\leq 0}$ für alle $\beta \in \Delta$.

Entsprechend heißt α **positiv** oder **negativ**.

Ist Δ gewählt, nennen wir jedes $\alpha \in \Delta$ **einfache Wurzel**.

Konstruktion: Wähle $\gamma \in E \setminus \bigcup_{\alpha \in \Phi} (\mathbb{R}\alpha)^{\perp}$ (**regulärer Vektor**)

und setze $\Phi^+(\gamma) = \{\alpha \in \Phi : (\gamma, \alpha) > 0\}$. Dann gilt

$\Phi = \Phi^+(\gamma) \cup -\Phi^+(\gamma)$. Wir nennen $\alpha \in \Phi^+(\gamma)$ **zerlegbar**,

falls $\alpha = \beta + \delta$ mit $\beta, \delta \in \Phi^+(\gamma)$. Dann bilden die

unzerlegbaren Wurzeln in $\Phi^+(\gamma)$ eine Basis $\Delta = \Delta(\gamma)$

und jede Basis entsteht so.

Beobachtung. Aus $\alpha, \beta \in \Delta$ und $\alpha \neq \beta$

folgt $(\alpha, \beta) \leq 0$.

Def. III.3.5 Die Zusammenhangskomponenten von $E \setminus \bigcup_{\alpha \in \Phi} (\mathbb{R}\alpha)^{\perp}$ heißen (**offene**) **Weyl-Kammern**.

Für eine Basis $\Delta \subset \Phi$ heißt

$$\mathcal{C}(\Delta) = \bigcap_{\alpha \in \Delta} \{x \in E : (x, \alpha) > 0\}$$

die **fundamentale Weyl-Kammer**

von Δ . Jede Weyl-Kammer ist

fundamental für genau ein $\Delta \subset \Phi$.

$\exists$ gilt

$$\Phi^+(r) = \Phi^+(r') \Leftrightarrow \Delta(r) = \Delta(r') \Leftrightarrow \mathcal{L}(\Delta(r)) = \mathcal{L}(\Delta(r'))$$

und für $\sigma \in \mathcal{W}(\Phi)$ folgt aus $(\sigma(\alpha), \sigma(\beta)) = (\alpha, \beta)$, dass
 $\sigma(\Phi^+(r)) = \Phi^+(\sigma(r))$, $\sigma(\Delta(r)) = \Delta(\sigma(r))$, $\sigma(\mathcal{L}(\Delta(r))) = \mathcal{L}(\Delta(\sigma(r)))$

- $\mathcal{W}$ wirkt einfach transitiv auf den Weyl-Kammern
(Basen, Mengen positiver Wurzeln).
- $\exists$ gilt $\mathcal{W} = \langle \sigma_\alpha : \alpha \in \Delta \rangle$.

Def. III.3.6 Wir nennen (E, Φ) **irreduzibel**, falls aus
 $\Phi = \Phi_1 \cup \Phi_2$ mit $\Phi_1 \perp \Phi_2$ folgt, dass $\Phi_1 = \emptyset$ oder $\Phi_2 = \emptyset$.

Definieren wir Irreduzibilität für Basen genauso, gilt
 Φ irr. $\Leftrightarrow \Delta$ irr.

Prop. III.3.7 Sei Φ irr. Dann ist $\mathcal{W} \curvearrowright E$ irr.

Bew. Ist $\{0\} \neq E' \subseteq E$ $\mathcal{W}$ -invariant, so auch $E'^\perp$.

Für $\alpha \in \Phi$ gilt $\alpha \in E'$ oder $E' \subseteq (\mathbb{R}\alpha)^\perp$ ($\Leftrightarrow \alpha \in E'^\perp$)

(HA 7.1). Weil Φ irr., folgt $\Phi \subset E'$ oder $\Phi \subset E'^\perp$.

Weil $\langle \Phi \rangle_{\mathbb{R}} = E$, muss $\Phi \subset E'$, also $E' = E$. $\square$

Prop. III.3.8 Sei Φ irr. Dann gibt es höchstens zwei
verschiedene Wurzellängen in Φ und die Bahnen von
 $\mathcal{W} \curvearrowright \Phi$ sind die Wurzeln gleicher Länge.

Bew. Seien $\alpha, \beta \in \Phi$ mit $\|\beta\|$ maximal. Nach III.3.7

ist $\langle \nu, \alpha \rangle_{\mathbb{R}} = \mathbb{E}$, also o. B. d. A. $\langle \alpha, \beta \rangle \neq 0$. Dann gilt $\frac{\|\beta\|}{\|\alpha\|} \in \{1, \sqrt{2}, \sqrt{3}\}$. Würden alle drei Fälle auftreten, gäbe es $\alpha_1, \alpha_2 \in \Phi$ mit $\frac{\|\beta\|}{\|\alpha_1\|} = \sqrt{2}$, $\frac{\|\beta\|}{\|\alpha_2\|} = \sqrt{3}$, aber dann $\frac{\|\alpha_2\|}{\|\alpha_1\|} = \sqrt{\frac{3}{2}}$, Widerspruch.

Seien nun $\alpha, \beta \in \Phi$ mit $\|\alpha\| = \|\beta\|$, wieder o. B. d. A. $\langle \alpha, \beta \rangle \neq 0$.

Dann gilt $\langle \alpha, \beta \rangle = \langle \beta, \alpha \rangle = \pm 1$. Weil $\sigma_{\beta}(\beta) = -\beta$,

o. B. d. A. $\langle \alpha, \beta \rangle = 1$. Dann gilt $(\sigma_{\alpha} \sigma_{\beta} \sigma_{\alpha})(\beta) =$

$$= \sigma_{\alpha} \sigma_{\beta}(\beta - \alpha) = \sigma_{\alpha}(\beta - \alpha - \beta) = \alpha. \quad \square$$

III.4 Klassifizierung der Wurzelsysteme

Sei (E, Φ) ein Wurzelsystem mit Wzyl-Gruppe $\mathcal{W}$ und Basis $\Delta = \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\} \subset \Phi$.

Def. III.4.1 Wir nennen $(\langle \alpha_i, \alpha_j \rangle) \in \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{Z})$ die **Cartan-Matrix** von Φ .

- Wohldefiniert, weil ν transitiv auf den Basen operiert.
- Invertierbar wie im Beweis von III.2.1.

Beispiele.

$$A_2 \times A_2: \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad A_2: \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B_2: \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}, \quad G_2: \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Beobachtung. Gilt für (E', Φ') , $\Delta' = \{\alpha'_1, \dots, \alpha'_n\} \subset \Phi'$, dass $\langle \alpha'_i, \alpha'_j \rangle = \langle \alpha_i, \alpha_j \rangle$, dann def. $\alpha_i \mapsto \alpha'_i$ einen Iso. $(E, \Phi) \xrightarrow{\cong} (E', \Phi')$.

→ Wurzelsysteme sind durch die Cartan-Matrizen eindeutig bestimmt. Umgekehrt lässt sich aus einer Cartan-Matrix das Wurzelsystem zurückgewinnen (Wurzelketten!)

Def. III.4.2 Der **Coxeter-Graph** von Φ hat Eckermenge Δ und für $i \neq j$ sind α_i und α_j durch $\langle \alpha_i, \alpha_j \rangle \cdot \langle \alpha_j, \alpha_i \rangle \in \{0, 1, 2, 3\}$ Kanten verbunden.

Beispiele

A_1 : $\circ$, $A_1 \times A_1$: $\circ \circ$, A_2 : $\circ - \circ$, B_2 : $\circ = \circ$, G_2 : $\circ = \circ$,
 A_3 : $\circ - \circ - \circ$, B_3 : $\circ - \circ = \circ$, C_3 : $\circ - \circ = \circ$.

Um die Cartan-Matrix aus dem Coxeter-Graph zurückzugewinnen, fehlt die Info, welche Wurzel größer ist, falls $\circ = \circ$ oder $\circ = \circ$. Füge entsprechend „<“ oder „>“ hinzu und erhalte das **Dynkin-Diagramm** von Φ :

B_2 : $\circ \rightarrow \circ$, G_2 : $\circ = \circ$, B_3 : $\circ - \circ \rightarrow \circ$, C_3 : $\circ - \circ \leftarrow \circ$.

Beobachtung: Φ irr. $\Leftrightarrow \Delta$ irr. $\Leftrightarrow$ Dynk.-Diag. zshg.

• Haben für allgemeines Φ eine eindeutige Zerlegung
 $\Phi = \Phi_1 \cup \dots \cup \Phi_r$ in $E = E_1 \oplus \dots \oplus E_r$ mit $E_i \perp E_j$ für $i \neq j$
 und (E_i, Φ_i) irr.

Wir müssen also noch die irreduziblen Wurzelsysteme oder äquivalent die zshg. Dynkin-Diagramme klassifizieren.

Satz III.4.3 Die Isomorphieklassen irreduzibler Wurzelsysteme vom Rang n entsprechen 1:1 folgenden Dynkin-Diagrammen:

} klassische Typen

} Ausnahmetypen

Bew. z.z.: 1.) Isomorphe Wurzelsysteme haben gleiche Dynkin-Diagramme.

2.) Nur die gelisteten Dynkindiagramme können auftreten.

3.) Wurzelsysteme mit gleichem Dynkin-Diagramm sind isomorph.

4.) Jedes gelistete Diagramm ist Dynkin-Diagramm eines Wurzelsystems.

2.) + 3.) sind klar, weil das Dynkin-Diagramm nur eine kompakte Notation für die Cartan-Matrix ist.

Zu 2.) Zeigen äquivalent, dass nur die zugrundeliegenden Coxeter-Graphen auftreten können. Dazu nehmen wir eine Teilmenge $\{\varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n\}$ lin. unabh. Einheitsvektoren eines euklidischen Raums $(E, (\cdot, \cdot))$ zulässig, falls $(\varepsilon_i, \varepsilon_j) \leq 0$ für $i \neq j$ und $4(\varepsilon_i, \varepsilon_j)^2 \in \{0, 1, 2, 3\}$ für $i \neq j$. Beachte: $\Delta \subseteq \Phi$ wird zulässig, indem man jedes $\alpha \in \Delta$ durch $\frac{\alpha}{\|\alpha\|}$ ersetzt. Wie zuvor entsteht ein Graph Γ mit n Knoten, indem für $i \neq j$ der i -te mit dem j -ten durch $4(\varepsilon_i, \varepsilon_j)^2$ Kanten verbunden ist.

Zu bestimmen: die durch zulässige Mengen entstehenden zusammenhängenden Graphen. Beobachtungen:

(i) $\{\varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{i-2}, \varepsilon_{i+2}, \dots, \varepsilon_n\}$ ist wieder zulässig und entspricht Entfernen des i -ten Knoten mitsamt seinen Kanten.

(ii) Die Anzahl der Paare verbundener Knoten ist $\leq n$:

Es gilt $0 < \|\sum_{i=2}^n \varepsilon_i\|^2 = n + 2 \sum_{i < j} (\varepsilon_i, \varepsilon_j)$ und $(\varepsilon_i, \varepsilon_j) \neq 0 \Rightarrow 2(\varepsilon_i, \varepsilon_j) \leq -1$.

(iii) Γ hat (als einfacher Graph) keine Zyklen:

Folgt aus (i) und (ii).

(iv) Höchstens drei Kanten beginnen an jedem Knoten in Γ :

Sei ε einer der zulässigen Vektoren und ε sei verbunden mit

$\eta_2, \dots, \eta_r$. Aus (iii) folgt $(\eta_i, \eta_j) = 0$ für $i \neq j$. Sei

$\eta_0 \in \{\eta_2, \dots, \eta_r\}^\perp \subseteq \langle \varepsilon, \eta_2, \dots, \eta_r \rangle_{\mathbb{R}}$ und $\|\eta_0\| = 1$.

Dann gilt $(\varepsilon, \eta_0) \neq 0$ und deshalb folgt aus

$$1 = \|\varepsilon\|^2 = \sum_{i=0}^n (\varepsilon, \eta_i)^2, \text{ dass } \sum_{i=2}^n 4(\varepsilon, \eta_i)^2 < 4.$$

(v) Eine Dreifachkante gibt es nur in $\Gamma = \equiv$:

Folgt aus (iv).

(vi) Jeder Typ- A_n Teilgraph kann durch einen Knoten ersetzt werden:

Nur zeigen $\{\varepsilon_2, \dots, \varepsilon_i, \varepsilon_{i+r+1}, \dots, \varepsilon_n\} \cup \underbrace{\left\{ \sum_{j=1}^k \varepsilon_{i+j} \right\}}_{=\varepsilon}$ ist zulässig.

$$\text{Es gilt } \|\varepsilon\|^2 = k + \sum_{j \in I} 2(\varepsilon_{i+j}, \varepsilon_{i+j}) = k + (k-1) \cdot (-1) = 1.$$

Nach (iii) gilt für jedes $\eta \in \{\varepsilon_2, \dots, \varepsilon_i, \varepsilon_{i+r+1}, \dots, \varepsilon_n\}$,

dass $(\eta, \varepsilon) = 0$ oder $= (\eta, \varepsilon_{i+j_0})$ für ein $j_0 \in \{1, \dots, k\}$.

Es folgt $4(\eta, \varepsilon)^2 \in \{0, 1, 2, 3\}$.

(vii) Γ hat keinen dieser Teilgraphen

Folgt aus (vi) und (iv).

(viii) Γ muss eine dieser Formen haben

Wegen (v) gibt es nur eine Dreifachkante. Gäbe es mehr als eine Doppelkante, hätte Γ einen Teilgraph im Widerspruch zu (vii). Wenn Γ eine Doppelkante hat, gibt es keinen Teilgraph , denn sonst gäbe es auch im Widerspruch zu (vii). Wegen (iii) bleibt dann nur . Hat Γ nur Einfachkanten, kann Γ höchstens einen Teilgraph haben, weil andernfalls auftritt im Widerspruch zu (vii). Wegen (iii) bleiben nur der erste und letzte Graph. (ix) Ist Γ von der Form ,

hat Γ Typ B_n/C_n oder Typ F_4 :

Folgt etwas schwieriger mithilfe der Cauchy-Schwarz-Ungl.

(x) Ist Γ von der letzten Form in (viii), hat Γ Typ

D_n, E_6, E_7 oder E_8 :

Folgt trivialerweise u. a. unter Herleitung der Ungleichung

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} + \frac{1}{r} > 1.$$

Zu 4.) Die klassischen Typen entstehen als Wurzelsysteme der klassischen Matrixalgebren aus I.2.(ii). Für die fünf verbleibenden Ausnahmetypen kann man eine explizite Konstruktion angeben, z. B. für G_2 : $\Phi =$

$$\pm \{ \varepsilon_1 - \varepsilon_2, \varepsilon_2 - \varepsilon_3, \varepsilon_2 - \varepsilon_3, 2\varepsilon_1 - \varepsilon_2 - \varepsilon_3, 2\varepsilon_2 - \varepsilon_1 - \varepsilon_3, 2\varepsilon_3 - \varepsilon_2 - \varepsilon_2 \} \subset (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)^\perp \subset \mathbb{R}^3$$

□

III.5 Automorphismen von Wurzelsystemen

Nach HA 6.2 gilt $\mathcal{W}(\Phi) \trianglelefteq \text{Aut } \Phi$. Für eine feste Basis $\Delta \subset \Phi$ sei $\text{Sym } \Delta = \{ \sigma \in \text{Aut } \Phi : \sigma(\Delta) = \Delta \}$. Für $\sigma \in \text{Aut } \Phi$ und alle $\alpha, \beta \in \Phi$ gilt $\langle \sigma(\alpha), \sigma(\beta) \rangle = \langle \alpha, \beta \rangle$, also ist jedes $\sigma \in \text{Sym } \Delta$ durch eine **Symmetrie** des Dynkin-Diagramms gegeben. Umgekehrt liefert jedes solche Symmetrie durch Fortsetzen ein $\sigma \in \text{Sym } \Delta$ und wir erkennen, dass $\text{Sym } \Delta$ mit der Gruppe der Dynkin-Diagramm-Symmetrien identifiziert werden kann.

Lemma III.5.1 Es gilt $\text{Aut } \Phi = \mathcal{W}(\Phi) \rtimes \text{Sym } \Delta$.

Bew. Aus $\sigma \in \mathcal{W}(\Phi) \cap \text{Sym } \Delta$ folgt $\sigma = \text{id}_E$, weil $\mathcal{W}(\Phi)$ einfach transitiv auf der Menge der Basen wirkt. Für $\sigma \in \text{Aut } \Phi$ ist $\sigma(\Delta)$ eine Basis, also gibt es $\tau \in \mathcal{W}(\Phi)$ mit $\tau(\sigma(\Delta)) = \Delta$, d.h. $\sigma = \underbrace{\tau^{-1}}_{\mathcal{W}(\Phi)} \circ \underbrace{(\tau \circ \sigma)}_{\text{Sym } \Delta}$. $\square$

Offensichtlich gilt für Typ A_n ($n \geq 2$), D_n ($n \geq 5$) und E_6 , dass $\text{Sym } \Delta \cong \mathbb{Z}/2$ und $\text{Sym } \Delta \cong S_3$ für Typ D_4 („**Triality**“). In allen anderen Typen gilt $\text{Sym } \Delta = 1$.

III.6 Konjugations-, Isomorphie- und Existenzsatz

Klassifizierungsschema (Erinnerung: $\text{char } K = 0$, $\bar{K} = K$).

$$\left\{ \mathfrak{g} \text{ einfach} \right\} \xleftrightarrow[\cong]{1:1} \left\{ (E, \Phi) \text{ irr. Wurzelsys.} \right\} \xleftrightarrow[\cong]{1:1} \left\{ \text{absol. Dynkin-Diag.} \right\} / \cong$$

$\uparrow$ ↑ ✓

Noch zu erledigen:

- 1.) Wohldefiniert: Unabh. von der Wahl einer CSA $h \in \mathfrak{g}$.
- 2.) Injektiv: Gilt für $\mathfrak{g}, \mathfrak{g}'$, dass $(E, \Phi) \cong (E', \Phi')$, folgt $\mathfrak{g} \cong \mathfrak{g}'$.
- 3.) Surjektiv: Ist Φ irr., gibt es $\mathfrak{g}$ einfach mit Wurzelsys. Φ .

Satz III.6.1. Sei $\mathfrak{g}$ halbeinfach mit CSAs $h, h' \in \mathfrak{g}$.

Dann gibt es $f \in \text{Aut } \mathfrak{g}$ mit $f(h') = h$.

Bew. Aufwendig [Humphreys, §§ 15-16]. $\square$

Satz III.6.2 Seien $\mathfrak{g}, \mathfrak{g}'$ einfach mit CSAs $h \in \mathfrak{g}, h' \in \mathfrak{g}'$, sodass $\Phi \cong \Phi'$ (induziert $f: h \rightarrow h'$). Sei $\Delta \subset \Phi$ eine Basis (induziert $\Delta' \subset \Phi'$). Seien $0 \neq x_\alpha \in \mathfrak{g}_\alpha$ für $\alpha \in \Delta$ und $0 \neq x'_\alpha \in \mathfrak{g}'_\alpha$ bel.

Dann gibt es einen eindeutigen Iso. $F: \mathfrak{g} \xrightarrow{\cong} \mathfrak{g}'$ mit $F|_h = f$ und $F(x_\alpha) = x'_\alpha$ für alle $\alpha \in \Delta$.

Bew. Seien $\gamma_\alpha \in \mathfrak{g}_{-\alpha}, \gamma'_\alpha \in \mathfrak{g}'_{-\alpha}$ für $\alpha \in \Delta$ wie in III.1.1.(vi). Sei $D \subseteq \mathfrak{g} \oplus \mathfrak{g}'$ erzeugt von $\{x_\alpha \oplus x'_\alpha, \gamma_\alpha \oplus \gamma'_\alpha, h_\alpha \oplus h'_\alpha : \alpha \in \Delta\}$. Dann gilt für die Projektionen

$$\mathfrak{g} \oplus \mathfrak{g}' \begin{array}{l} \xrightarrow{p} \mathfrak{g} \\ \xrightarrow{p'} \mathfrak{g}' \end{array}$$

dass $p|_D$ und $p'|_D$ jeweils Iso. sind [H., § 14.2]. $\square$

Für eine Menge X heißt $\mathfrak{F}(X) = \langle X \rangle \subset \bigoplus_{k \in \mathbb{N}} \bigotimes_{i=0}^k KX$ mit Kommutator-Klammer die **freie Lie-Algebra** über X .

Satz III.6.3 (Serre) Sei $\mathfrak{g}$ irr. mit Basis $\Delta = \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$
 und $\mathfrak{g}$ der Quotient von $\mathfrak{F}\{x_i, y_i, h_i : 1 \leq i \leq n\}$
 nach dem Ideal erzeugt von

- $[h_i, h_j]$,
- $[x_i, y_i] - h_i, [x_i, y_j]$ für $i \neq j$,
- $[h_i, x_j] - \langle \alpha_j, \alpha_i \rangle x_j, [h_i, y_j] + \langle \alpha_j, \alpha_i \rangle y_j$,
- $(\text{ad } x_i)^{-\langle \alpha_j, \alpha_i \rangle + 1}(x_j), (\text{ad } y_i)^{-\langle \alpha_j, \alpha_i \rangle + 1}(y_j)$.

Dann ist $\mathfrak{g}$ endl. dim. einfach mit CSA $\langle h_i \rangle_K$ und $\mathfrak{g}(\mathfrak{g}) = \mathfrak{g}$.

Bew. [H., § 18]. □

III.7 Automorphismen einfacher Lie-Algebren

Satz III.7.1 Sei $\mathfrak{g}$ einfach mit CSA $\mathfrak{h} \subseteq \mathfrak{g}$ und Basis $\Delta \subseteq \mathfrak{g}$.

Dann gilt $\text{Aut } \mathfrak{g} \cong \text{Int } \mathfrak{g} \rtimes \text{Sym } \Delta$.

Bew. Aus Satz III.6.2 erhalten wir für jedes $\sigma \in \text{Aut } \mathfrak{g}$
 ein $\bar{\sigma} \in \text{Aut } \mathfrak{g}$ mit $\bar{\sigma}|_{\mathfrak{h}} = \sigma$ und $(\bar{\cdot}) : \text{Sym } \Delta \rightarrow \text{Aut } \mathfrak{g}$
 definiert eine Inklusion als Untergruppe.

Sei $g \in \text{Aut } \mathfrak{g}$ beliebig. Nach III.6.1 gibt es $f \in \text{Int } \mathfrak{g}$
 mit $f(g(\mathfrak{h})) = \mathfrak{h}$ und wir erhalten $f \circ g|_{\mathfrak{h}} = \sigma \in \text{Aut } \mathfrak{h}$
 (mit $\mathfrak{h} \subset \mathfrak{h} \cong \mathfrak{h}^*$). Nach III.5.1 gibt es $\tau \in \mathcal{K}(\mathfrak{h})$ mit

$\tau \circ \sigma \in \text{Sym } \Delta$. Man kann nun $\bar{\tau} \in \text{Int } \mathfrak{g}$ so wählen, dass
 $g = (\bar{\tau} \circ f)^{-1} \circ (\bar{\tau} \circ \sigma)$ mit $(\bar{\tau} \circ f)^{-1} \in \text{Int } \mathfrak{g}, \bar{\tau} \circ \sigma \in \overline{\text{Sym } \Delta}$.

Für $\text{Int } \mathfrak{g} \cap \overline{\text{Sym } \Delta} = \{1\}$ verweisen wir auf [Bourbaki, Lie VIII.5]. □

Blatt 1

- 1.) Rechnen Sie nach, dass $\mathfrak{so}_{2n}(K) \subset \mathfrak{gl}_{2n}(K)$ tatsächlich eine Unteralgebra ist.
- 2.) Zeigen Sie für $\mathfrak{t}_n(K) = \mathfrak{d}_n(K) \oplus \mathfrak{n}_n(K)$, dass
 - (i) $[\mathfrak{d}_n(K), \mathfrak{n}_n(K)] = \mathfrak{n}_n(K)$.
 - (ii) $[\mathfrak{t}_n(K), \mathfrak{t}_n(K)] = \mathfrak{n}_n(K)$.
- 3.) Die Matrix $x \in \mathfrak{gl}_n(K)$ habe n verschiedene Eigenwerte $a_1, \dots, a_n \in K$. Zeigen Sie, dass $\text{ad } x$ die Eigenwerte $a_i - a_j$ mit $1 \leq i, j \leq n$ hat.

Blatt 2

Sei $\mathfrak{g}$ eine Lie-Algebra über K .

- 1.) Sei $\mathfrak{a} \trianglelefteq \mathfrak{g}$ ein Ideal. Zeigen Sie durch vollständige Induktion, dass

$$D^n(\mathfrak{g})/\mathfrak{a} \cong D^n(\mathfrak{g}/\mathfrak{a}) \text{ für alle } n \geq 0.$$

- 2.) Zeigen Sie, dass $\mathfrak{g}/\text{Rad}(\mathfrak{g})$ halbeinfach ist.

- 3.) Zeigen Sie, dass $\mathfrak{g}$ genau dann auflösbar ist, wenn es eine Folge

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{g}_0 \supseteq \mathfrak{g}_1 \supseteq \dots \supseteq \mathfrak{g}_k = \{0\}$$

gibt mit $\mathfrak{g}_i/\mathfrak{g}_{i+1}$ abelsch für $i = 0, \dots, k-1$.

Blatt 3

- 1.) Sei $\mathfrak{g}$ nilpotent, $h \notin \mathfrak{g}$. Zeigen Sie, dass $h \notin \mathfrak{n}_{\mathfrak{g}}(h)$.
- 2.) Sei $\mathfrak{g}$ eine Lie-Algebra und $\mathfrak{a} \triangleleft \mathfrak{g}$, sodass $\mathfrak{g}/\mathfrak{a}$ nilpotent ist und sodass $\text{ad}(x)|_{\mathfrak{a}}$ nilpotent ist für alle $x \in \mathfrak{g}$. Zeigen Sie, dass $\mathfrak{g}$ nilpotent ist.
- 3.) Zeigen Sie, dass jede nilpotente Lie-Algebra $\{0\} \neq \mathfrak{g}$ eine äußere Derivation besitzt.
(Hinweis: Nutze $\mathfrak{g} \cong \mathfrak{a} \oplus \mathbb{K} \cdot x$ mit $\mathfrak{a} \triangleleft \mathfrak{g}$.
Dann gilt $Z_{\mathfrak{g}}(\mathfrak{a}) \neq \{0\}$. Wähle n maximal mit $Z_{\mathfrak{g}}(\mathfrak{a}) \subseteq \mathcal{L}^n(\mathfrak{g})$ und ein beliebiges $z \in Z_{\mathfrak{g}}(\mathfrak{a}) \setminus \mathcal{L}^{n+1}(\mathfrak{g})$. Dann ist $\delta: \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}$ definiert durch $\delta|_{\mathfrak{a}} = 0$ und $\delta(x) = z$ eine äußere Derivation.)

Blatt 4

- 1.) Zeigen Sie, dass die Killing-Form B einer nilpotenten Lie-Algebra $\mathfrak{g}$ verschwindet.
- 2.) Zeigen Sie, dass eine Lie-Algebra $\mathfrak{g}$ genau dann auflösbar ist, wenn $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}] \subseteq \text{Rad } B$.
- 3.) Finden Sie eine auflösbare Lie-Algebra $\mathfrak{g}$ mit $B \neq 0$.

Hinweis: Auch in den Übungen gilt fortan
dass $K = \mathbb{O}$ und $K = \overline{K}$.

Blatt 5

- 1.) Konstruieren Sie eine irreduzible $\mathfrak{sl}_2(K)$ -Darstellung jeder Dimension ≥ 1 .
(Hinweis: Lemma II.8.2. Zum Nachweis der Modulaxiome genügt es zu zeigen, dass die Endomorphismen x, h, z die selben Kommutatorrelationen wie x, y, z erfüllen.)
- 2.) Zeigen Sie, dass in den klassischen Lie-Algebren vom Typ A_n, B_n, C_n, D_n die Diagonalmatrizen eine CSA mit Dimension n bilden.
- 3.) Sei $\mathfrak{g}$ halbeinfach und $\mathfrak{h} \leq \mathfrak{g}$ eine CSA. Zeigen Sie, dass $n_{\mathfrak{g}}(\mathfrak{h}) = \mathfrak{h}$.

Blatt 6

- 1.) Zeigen Sie, dass es keine halbeinfache Lie-Algebra der Dimension vier, fünf oder sieben gibt.
- 2.) Zeigen Sie, dass für jedes Wurzelsystem $\Phi \subset E$ die Weyl-Gruppe $\mathcal{W}$ ein Normalteiler von $\text{Aut } \Phi$ ist.
- 3.) Sei $\Phi \subset E$ ein Wurzelsystem. Für $\alpha \in E \setminus \{0\}$ sei $\alpha^\vee = \frac{2\alpha}{(\alpha, \alpha)}$ und $\Phi^\vee = \{\alpha^\vee : \alpha \in \Phi\}$. Beweisen Sie, dass $\Phi^\vee$ ein Wurzelsystem ist und dass kanonisch $\mathcal{W}(\Phi) \cong \mathcal{W}(\Phi^\vee)$. Zeigen Sie außerdem, dass $\langle \alpha^\vee, \beta^\vee \rangle = \langle \beta, \alpha \rangle$ und zeichnen Sie $\Phi, \Phi^\vee \subset E$ für Φ vom Typ A_2, B_2, G_2 . Gilt im Allgemeinen $\Phi \cong \Phi^\vee$?

Blatt 7

Sei (E, Φ) ein Wurzelsystem und $\Delta \subset \Phi$ eine Basis.

1.) Für einen Unterraum $E' \subseteq E$ und $\alpha \in \Phi$ gelte $\sigma_\alpha(E') = E'$. Zeigen Sie, dass entweder $\alpha \in E'$ oder $E' \subset (\mathbb{R}\alpha)^\perp$.

2.) Sei $\alpha \in \Phi$ einfach. Zeigen Sie $\sigma_\alpha(\Phi^+ \setminus \{\alpha\}) \subseteq \Phi^+ \setminus \{\alpha\}$.

3.) Sei $\rho = \frac{1}{2} \sum_{\beta \in \Phi^+} \beta$ und $\alpha \in \Delta$. Zeigen Sie $\sigma_\alpha(\rho) = \rho - \alpha$.

4.) Sei $\sigma \in W(\Phi)$ das eindeutige Element mit $\sigma(\Phi^+) = \Phi^-$.

Zeigen Sie, dass in jeder Darstellung $\sigma = \sigma_{\alpha_1} \dots \sigma_{\alpha_k}$ von σ als reduziertes Wort mit $\alpha_i \in \Delta$ jedes σ_α

für $\alpha \in \Delta$ vorkommen muss. Für welche irreduziblen Wurzelsysteme von Rang zwei und drei gilt

$\sigma = -\text{id}_E$?

Lösung 1

1.) Offensichtlich ist $\mathfrak{so}_{2n}(K) \subseteq \mathfrak{gl}_n(K)$ ein K -Untervektorraum. Seien $x, y \in \mathfrak{so}_{2n}(K)$, d.h. $x^T m + m x = 0$ und $y^T m + m y = 0$ mit $m = \begin{pmatrix} 0 & I_n \\ -I_n & 0 \end{pmatrix}$ und $I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ & \ddots \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Dann gilt

$$\begin{aligned} [x, y]^T m + m [x, y] &= (xy - yx)^T m + m (xy - yx) = \\ &= y^T x^T m - x^T y^T m + m x y - m y x = \\ &= y^T (-m x) - x^T (-m y) + (-x^T m) y - (-y^T m) x = 0. \end{aligned}$$

2.) (i) Wir zeigen zunächst für jeden Basisvektor $e_i = \begin{pmatrix} 0 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 0 \end{pmatrix}_i$ von $\mathfrak{d}_n(K)$, dass

$[e_i, x] \in \mathfrak{n}_n(K)$ für alle $x \in \mathfrak{n}_n(K)$.

In der Tat gilt

$$[e_i, x] = e_i \cdot x - x \cdot e_i = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 \\ x_{i2} & \dots & x_{in} \\ \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & x_{1i} & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & x_{ni} & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

Weil $x_{i1} = \dots = x_{ii} = 0$ und $x_{ii} = \dots = x_{ni} = 0$,

ist dies eine strikte obere Dreiecksmatrix.

Somit folgt $[\mathfrak{d}_n(K), \mathfrak{n}_n(K)] \subseteq \mathfrak{n}_n(K)$.

Sei I_{ij} die $(n \times n)$ -Matrix $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ \vdots & & \vdots \end{pmatrix}$. Dann gilt

für $i > j$, dass $[e_i, I_{ij}] = I_{ij}$, also auch

$\mathfrak{n}_n(K) \subseteq [\mathfrak{d}_n(K), \mathfrak{n}_n(K)]$.

(ii) „ $\supseteq$ “ folgt sofort aus (i) und „ $\subseteq$ “ folgt ebenfalls aus (i), weil $t_n(K) = d_n(K) \oplus \mathfrak{n}_n(K)$.

3.) Das charakt. Polynom von $x \in \mathfrak{gl}_n(K)$ zerfällt nach Annahme in verschiedene Linearfaktoren.

Daher gibt es eine Basis aus EVeN für x

und wir dürfen annehmen $x = \begin{pmatrix} a_1 & & \\ & \ddots & \\ & & a_n \end{pmatrix}$.

$$\begin{aligned} \text{Dann gilt } \text{ad}_x(I_{ij}) &= [x, I_{ij}] = xI_{ij} - I_{ij}x = \\ &= a_i \cdot I_{ij} - a_j I_{ij} = (a_i - a_j) \cdot I_{ij}. \end{aligned}$$

Lösung 2

1.) Induktionsanfang: Es gilt $D^0(\mathfrak{A})/\mathfrak{a} \cong \mathfrak{A}/\mathfrak{a} \cong D^0(\mathfrak{A}/\mathfrak{a})$.

Induktionsschritt: Sei $\phi: \mathfrak{A} \rightarrow \mathfrak{A}/\mathfrak{a}$ die kanonische Abbildung. Dann gilt $D^n(\mathfrak{A})/\mathfrak{a} \cong \phi(D^n(\mathfrak{A})) \cong \phi([D^{n-1}(\mathfrak{A}), D^{n-1}(\mathfrak{A})]) = [\phi(D^{n-1}(\mathfrak{A})), \phi(D^{n-1}(\mathfrak{A}))] = [D^{n-1}(\mathfrak{A})/\mathfrak{a}, D^{n-1}(\mathfrak{A})/\mathfrak{a}] \stackrel{I.V.}{\cong} [D^{n-1}(\mathfrak{A}/\mathfrak{a}), D^{n-1}(\mathfrak{A}/\mathfrak{a})] = D^n(\mathfrak{A}/\mathfrak{a}). \quad \square$

2.) Sei $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{A}/\text{Rad}(\mathfrak{A})$ auflösbar, $\mathfrak{b} = \phi^{-1}(\mathfrak{a})$ für $\phi: \mathfrak{A} \rightarrow \mathfrak{A}/\text{Rad}(\mathfrak{A})$. Dann ist $\mathfrak{b} \subseteq \mathfrak{A}$, denn für $x \in \mathfrak{b}, y \in \mathfrak{A}$ gilt $\phi([y, x]) = [\phi(y), \phi(x)] \in \mathfrak{a}$, also $[y, x] \in \mathfrak{b}$. Außerdem ist $\mathfrak{b}$ auflösbar lt I.6.3, denn $\phi(\mathfrak{b})$ und $\mathfrak{b} \cap \text{Rad}(\mathfrak{A})$ sind auflösbar. Es folgt $\mathfrak{b} \subseteq \text{Rad}(\mathfrak{A})$, also $\mathfrak{a} = \phi(\mathfrak{b}) = \{0\}$. $\square$

3.) Ist $\mathfrak{A}$ auflösbar, liefert die derivierte Reihe $\mathfrak{A} = D^0\mathfrak{A} \supseteq D^1\mathfrak{A} \supseteq \dots \supseteq D^i\mathfrak{A} = \{0\}$ das Gewünschte, denn wegen $D^{i+2}\mathfrak{A} = [D^i\mathfrak{A}, D^i\mathfrak{A}]$ ist $D^i\mathfrak{A}/D^{i+2}\mathfrak{A}$ nach Konstruktion abelsch.

Gibt es umgekehrt

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{A}_0 \supseteq \mathfrak{A}_2 \supseteq \dots \supseteq \mathfrak{A}_n = \{0\}$$

mit $\mathfrak{a}_i/\mathfrak{a}_{i+1}$ abelsch, beweisen wir $D^i \mathfrak{a} \leq \mathfrak{a}_i$
durch Induktion nach i .

Induktionsanfang: $D^0(\mathfrak{a}) = \mathfrak{a} = \mathfrak{a}_0$.

Induktionsschritt: Es gilt $D^{i+1} \mathfrak{a} = [D^i \mathfrak{a}, D^i \mathfrak{a}]$
^{i.v.}
 $\leq [\mathfrak{a}_i, \mathfrak{a}_i]$. Weil $\mathfrak{a}_i/\mathfrak{a}_{i+1}$ abelsch ist,

gilt für alle $x, y \in \mathfrak{a}_i$, dass $[x + \mathfrak{a}_{i+1}, y + \mathfrak{a}_{i+1}] =$
 $= \mathfrak{a}_{i+1}$, d.h. $[x, y] + \mathfrak{a}_{i+1} = \mathfrak{a}_{i+1} \Leftrightarrow [x, y] \in \mathfrak{a}_{i+1}$.

Somit folgt $D^{i+1} \mathfrak{a} \leq [\mathfrak{a}_i, \mathfrak{a}_i] \leq \mathfrak{a}_{i+1}$.

Weil $\mathfrak{a}_2 = \{0\}$, schließen wir $D^2 \mathfrak{a} = \{0\}$, d.h.
 $\mathfrak{a}$ ist auflösbar.

Lösung 3

1.) Anwenden von I.7.5 auf $\text{ad}(h) \in \mathfrak{g}/\mathfrak{h}$ liefert ein $x \in \mathfrak{g} \setminus \mathfrak{h}$ mit $[h, x] \in \mathfrak{h}$ für alle $h \in \mathfrak{h}$, d.h. $\mathfrak{h} \subseteq N_{\mathfrak{g}}(\mathfrak{h})$. $\square$

2.) Weil $\mathfrak{g}/\alpha$ nilpotent ist, gibt es $N \gg 0$ mit $\mathcal{C}^N(\mathfrak{g}/\alpha) = \{0\}$, d.h. $\mathcal{C}^N(\mathfrak{g}) \subseteq \alpha$. Somit ist $\text{ad}(x)|_{\mathcal{C}^N(\mathfrak{g})}$ nilpotent für alle $x \in \mathfrak{g}$ und daher $\mathcal{C}^N(\mathfrak{g})$ nilpotent laut Satz von Engel. Es folgt, dass $\mathfrak{g}$ nilpotent ist. $\square$

3.) Wir haben $\alpha \subseteq \mathfrak{g}$ der Kodimension eins:
Weil $\mathfrak{g}$ nilpotent ist, gilt $0 < \dim \mathfrak{g}/[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$.
Wähle einen beliebigen Unterraum $\alpha' \subseteq \mathfrak{g}/[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$ der Kodimension eins und setze $\alpha = p^{-1}(\alpha')$ für $p: \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}/[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$. Wie schon gesehen gilt $\alpha \subseteq \mathfrak{g}$ und $\dim \alpha = \dim \alpha' + \dim \alpha \cap [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}] = (\dim \mathfrak{g} - \dim [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}] - 1) + \dim [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}] = \dim \mathfrak{g} - 1$.

Wählen wir $x \in \mathfrak{g} \setminus \alpha$, folgt also $\mathfrak{g} = \alpha \oplus \mathbb{K} \cdot x$ (Vektorraumzerlegung). Falls $\alpha = \{0\}$, gilt $\mathcal{Z}_{\mathfrak{g}}(\alpha) = \mathfrak{g} \neq \{0\}$. Andernfalls gilt $\mathcal{Z}(\alpha) \neq \{0\}$, weil α

nilpotent ist. Wegen $z(\alpha) \in z_{\mathfrak{g}}(\alpha)$ gilt also in jedem Fall $z_{\mathfrak{g}}(\alpha) \neq \{0\}$.

Sei n maximal mit $z_{\mathfrak{g}}(\alpha) \subseteq \mathcal{L}^n(\mathfrak{g})$ und wähle $z \in z_{\mathfrak{g}}(\alpha) \setminus \mathcal{L}^{n+1}(\mathfrak{g})$, sowie $x \in \mathfrak{g} \setminus \alpha$.

Dann ist $\mathfrak{g} \cong \alpha \oplus k \cdot x$ und $\delta: \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}$ definiert durch $\delta|_{\alpha} = 0$ und $\delta(x) = z$ eine Derivation,

denn für $a_1 + \lambda_1 x, a_2 + \lambda_2 x \in \alpha \oplus k \cdot x$ folgt

$$[a_1 + \lambda_1 x, a_2 + \lambda_2 x] = [a_1, a_2] + \lambda_1 [x, a_2] + \lambda_2 [a_1, x] \in \alpha,$$

also $\delta([a_1 + \lambda_1 x, a_2 + \lambda_2 x]) = 0$ und

anderseits gilt auch

$$\begin{aligned} & [\delta(a_2 + \lambda_2 x), a_2 + \lambda_2 x] + [a_2 + \lambda_2 x, \delta(a_2 + \lambda_2 x)] \\ &= [\lambda_2 z, a_2 + \lambda_2 x] + [a_2 + \lambda_2 x, \lambda_2 z] = \\ &= \lambda_2 \lambda_2 [z, x] + \lambda_2 \lambda_2 [x, z] = 0. \end{aligned}$$

Angenommen, es gäbe $y \in \mathfrak{g}$ mit $\delta = \text{ad}(y)$.

Dann würde gelten $[y, \alpha] = \delta(\alpha) = 0$, d.h.

$$y \in z_{\mathfrak{g}}(\alpha) \subseteq \mathcal{L}^n(\mathfrak{g}), \text{ also}$$

$$z = \delta(x) = [y, x] \in \mathcal{L}^{n+1}(\mathfrak{g}),$$

Widerspruch. Somit ist δ eine äußere Derivation. $\square$

Lösung 4

1.) Sei $\mathfrak{g}$ nilpotent und $x, y \in \mathfrak{g}$. Dann ist $(\text{ad } x \text{ ad } y) \in \text{End } \mathfrak{g}$ ein nilpotenter Endomorphismus, denn für alle $z \in \mathfrak{g}$ haben wir $(\text{ad } x \text{ ad } y)^n(z) \in \mathcal{L}^{2n} \mathfrak{g}$ und $\mathcal{L}^n \mathfrak{g} = \{0\}$ für $n \gg 0$. Es folgt $B(x, y) = \text{Spur}(\text{ad } x \text{ ad } y) = 0$.

2.) Sei $\mathfrak{g}$ auflösbar. Nach dem Satz von Lie gibt es eine Basis von $\mathfrak{g}$ bzgl. der $\text{ad } \mathfrak{g} \subseteq \mathfrak{t}_n(K)$. Für $x \in [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$ gilt folglich $\text{ad } x \in [\mathfrak{t}_n(K), \mathfrak{t}_n(K)] = \mathfrak{n}_n(K)$ und somit auch $\text{ad } x \text{ ad } y \in \mathfrak{n}_n(K)$ für alle $y \in \mathfrak{g}$. Es folgt $B(x, y) = \text{Spur}(\text{ad } x \text{ ad } y) = 0$, also $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}] \subseteq \text{Rad } \mathfrak{B}$. Die Umkehrung ist die Aussage von Korollar II.3.4.

3.) Betrachte die Lie-Algebra $\mathfrak{g}$ mit Basis $\{x, y\}$ und $[x, y] = x$. (Zum Nachweis der Jacobi-Identität genügt die Rechnung:

$$\begin{aligned} & [y, [x, y]] + [x, [y, y]] + [y, [y, x]] = \\ = & \quad -x \quad \quad + 0 \quad \quad + x \quad = 0. \end{aligned}$$

Es gilt $\mathcal{D}^2 \mathfrak{g} = [Kx, Kx] = \{0\}$, also ist $\mathfrak{g}$ auflösbar. Bzgl. der Basis $\{x, y\} \subseteq \mathfrak{g}$ haben wir $\text{ad } y = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Also gilt $B(y, y) = \text{Spur} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 1 \neq 0$.

Lösung 5

1.) Wir definieren $V(m) = \langle v_0, v_1, \dots, v_m \rangle_K$ mit der $\mathfrak{sl}_2(K)$ -Wirkung wie in II.8.2. und zeigen, dass dies einen Homomorphismus $\phi: \mathfrak{sl}_2(K) \rightarrow \mathfrak{gl}(V)$ definiert:

- $[h, x] \cdot v_i = (h \cdot x - x \cdot h) \cdot v_i = (m-i+1)h \cdot v_{i-2} - (m-2i)x \cdot v_i = (m-i+1)(m-2(i-1)) \cdot v_{i-2} - (m-2i)(m-i+1) \cdot v_{i-2} = 2 \cdot (m-i+1) \cdot v_{i-2} = 2 \cdot x \cdot v_i = [h, x] \cdot v_i$
- $[h, y] \cdot v_i = (h \cdot y - y \cdot h) \cdot v_i = (i+1) \cdot h \cdot v_{i+2} - (m-2i) \cdot y \cdot v_i = (i+1)(m-2(i+1)) \cdot v_{i+2} - (m-2i)(i+1) \cdot v_{i+2} = (-2) \cdot (i+1) \cdot v_{i+2} = -2y \cdot v_i = [h, y] \cdot v_i$
- $[x, y] \cdot v_i = (x \cdot y - y \cdot x) \cdot v_i = (i+1) \cdot x \cdot v_{i+1} - (m-i+1)y \cdot v_{i-1} = (i+1)(m-(i+2)+1) \cdot v_i - (m-i+1) \cdot i \cdot v_i = (i+1 - i^2 - i + i + m - i - 1 + 1 - m + i + i^2 - i) \cdot v_i = (m-2i) \cdot v_i = h \cdot v_i = [x, y] \cdot v_i$

Sei $\{0\} \neq W \subseteq V(m)$ ein invarianter Unterraum

und $0 \neq w \in \sum_{i=0}^m \lambda_i v_i \in W$. Sei i_0 maximal mit $\lambda_{i_0} \neq 0$.

Dann gilt $0 \neq (x.)^{i_0} w \in K \cdot v_0$, also folgt $W = V$, d.h.

$V(m)$ ist irreduzibel.

2.) Sei $\mathfrak{g}$ eine der klassischen Lie-Algebren.
 Wegen II.7.2 bilden die Diagonalmatrizen eine
 torische Unteralgebra $\mathfrak{d} \leq \mathfrak{g}$. Ist $\mathfrak{g} \supseteq \mathfrak{t} \supseteq \mathfrak{d}$
 torisch und $x \in \mathfrak{t}$, so ist x wieder wegen II.7.2
 diagonalisierbar und kommutiert mit allen $y \in \mathfrak{d}$ wegen
 II.9.2. Weil aber in Typ

$$\begin{aligned}
 A_n: & \quad I_{i,i} - I_{n+2, n+2} \in \mathfrak{d} & \text{für } i=1, \dots, n, \\
 B_n: & \quad I_{i,i} - I_{2n+3-i, 2n+3-i} \in \mathfrak{d} & \text{für } i=2, \dots, n+1, \\
 C_n, D_n: & \quad I_{i,i} - I_{2n+2-i, 2n+2-i} \in \mathfrak{d} & \text{für } i=1, \dots, n,
 \end{aligned}$$

ist die gemeinsame Eigenraumzerlegung von x und
 allen $y \in \mathfrak{d}$ bereits festgelegt, d.h. $x \in \mathfrak{d}$ und
 $\mathfrak{d}$ ist maximal torisch. Aus obiger Liste folgt zudem
 $\dim \mathfrak{d} = n$.

3.) Sei $x \in \mathfrak{n}_{\mathfrak{g}}(\mathfrak{h})$. Schreibe $x = h_0 + \sum_{\alpha \in \Phi} x_{\alpha}$ gemäß
 Cartan-Zerlegung. Dann gilt für alle $h \in \mathfrak{h}$, dass
 $h \ni [h, x] = \sum_{\alpha \in \Phi} \alpha(h) x_{\alpha} \in \bigoplus_{\alpha \in \Phi} \mathfrak{g}_{\alpha}$, also $[h, x] \in$
 $\mathfrak{h} \cap \bigoplus_{\alpha \in \Phi} \mathfrak{g}_{\alpha} = \{0\}$, d.h. $[h, x] = 0$ und somit
 $x \in \mathfrak{z}(\mathfrak{h}) \stackrel{\text{II.9.8}}{=} \mathfrak{h}$.

Lösung 6

1.) Weil Wurzeln in Paaren $\pm \alpha$ auftreten, ist $\dim \bigoplus_{\alpha \in \Phi} \mathfrak{g}_\alpha$ gerade, also $\dim \mathfrak{g} \equiv \dim \mathfrak{h} \pmod{2}$ (2).

Würde also $\dim \mathfrak{g} = 4$ gelten, muss $\dim \mathfrak{h} = 2$, denn es gibt immer eine CSA $\mathfrak{h} \neq \{0\}$ und $\mathfrak{g}$ ist nicht abelsch. Aber dann müsste $\Phi = \{\pm \alpha\}$ für ein $\alpha \in \mathfrak{h}^*$ gelten im Widerspruch zu $\langle \Phi \rangle = \mathfrak{h}^*$.

Aus $\dim \mathfrak{g} = 5$ folgt $\dim \mathfrak{h} = 1$ oder 3 . Falls $\dim \mathfrak{h} = 1$, muss $\Phi = \{\pm \alpha\}$, also $\dim \mathfrak{g} = 3$, Widerspruch. Falls $\dim \mathfrak{h} = 3$, muss ebenfalls $\Phi = \{\pm \alpha\}$, wieder im Widerspruch zu $\langle \Phi \rangle = \mathfrak{h}^*$.

Aus $\dim \mathfrak{g} = 7$ folgt zunächst $\dim \mathfrak{h} = 1, 3$ oder 5 , aber wie oben schließen wir $\dim \mathfrak{h} = 1$ oder 5 aus. Falls $\dim \mathfrak{h} = 3$, muss $\Phi = \{\pm \alpha, \pm \beta\}$, was erneut $\langle \Phi \rangle = \mathfrak{h}^*$ widerspricht.

2.) Sei $\sigma_\alpha \in \mathcal{W}$ ein Erzeuger und $\tau \in \text{Aut } \Phi$. Dann gilt für $\beta \in \Phi$, dass

$$\begin{aligned} \tau \sigma_\alpha \tau^{-1}(\beta) &= \tau(\tau^{-1}(\beta) - \langle \tau^{-1}(\beta), \alpha \rangle \cdot \alpha) = \\ &= \beta - \langle \beta, \tau(\alpha) \rangle \cdot \tau(\alpha) = \sigma_{\tau(\alpha)}(\beta). \end{aligned}$$

Weil $R\Phi = E$, folgt $\tau \sigma_\alpha \tau^{-1} = \sigma_{\tau(\alpha)}$ in $GL(E)$.

Weil jedes $g \in \mathcal{W}$ von der Form $g = \sigma_{\alpha_2} \circ \sigma_{\alpha_2} \circ \dots \circ \sigma_{\alpha_1}$

für $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \Phi$ ist, gilt $\tau g \tau^{-1} = \tau \sigma_{\alpha_1} \tau^{-1} \circ \dots \circ \tau \sigma_{\alpha_n} \tau^{-1} = \tau_{\tau(\alpha_1)} \circ \dots \circ \tau_{\tau(\alpha_n)} \in \mathcal{W}$.

3.) Die Axiome (W1) und (W2) sind für $\Phi^\vee$ klar.

Seien $\alpha^\vee, \beta^\vee \in \Phi^\vee$. Dann gilt $\sigma_{\alpha^\vee}(\beta^\vee) = \sigma_\alpha(\beta^\vee) = \sigma_\alpha\left(\frac{2\beta}{(\beta, \beta)}\right) = \frac{2}{(\beta, \beta)} \sigma_\alpha(\beta) = \frac{2 \sigma_\alpha(\beta)}{(\sigma_\alpha(\beta), \sigma_\alpha(\beta))} \in \Phi^\vee$.

Dies zeigt (W3). Schließlich gilt $\langle \beta^\vee, \alpha^\vee \rangle = \frac{2(\beta^\vee, \alpha^\vee)}{(\alpha^\vee, \alpha^\vee)} = \frac{2(\beta^\vee, \alpha)}{(\alpha^\vee, \alpha)} = \frac{2(\beta, \alpha) \cancel{(\alpha, \alpha)}}{(\beta, \beta) \cdot \cancel{(\alpha, \alpha)}} = \langle \alpha, \beta \rangle \in \mathbb{Z}$.

Dies zeigt (W4). Der Iso. $\mathcal{W}(\Phi) \cong \mathcal{W}(\Phi^\vee)$ folgt

aus $\sigma_\alpha = \sigma_{\alpha^\vee}$ für alle $\alpha \in \Phi$. Die Identität

$\langle \beta^\vee, \alpha^\vee \rangle = \langle \alpha, \beta \rangle$ haben wir gerade gesehen. Bilder:

A_2 : ist selbstdual

Im Allgemeinen gilt nicht $\Phi \cong \Phi^\vee$, z. B. $B_3^\vee = C_3$.

Lösung 7

1.) Falls es $x \in E'$ gibt mit $\langle x, \alpha \rangle \neq 0$, dann gilt auch $\langle x, \alpha \rangle \neq 0$ und aus $x, \sigma_\alpha(x) \in E'$ folgt $\alpha = \frac{x - \sigma_\alpha(x)}{\langle x, \alpha \rangle} \in E'$.

2.) Sei $\beta \in \Phi^+ \setminus \{\alpha\}$, $\beta = \sum_{\gamma \in \Delta} k_\gamma \gamma$, $k_\gamma \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$.

Weil $\beta \neq \pm \alpha$, gibt es $\alpha \neq \gamma \in \Delta$ mit $k_\gamma > 0$.

Dieser Koeffizient bleibt in $\sigma_\alpha(\beta) = \beta - \langle \beta, \alpha \rangle \alpha$ erhalten, also muss $\sigma_\alpha(\beta) \in \Phi^+$ und außerdem $\sigma_\alpha(\beta) \neq \alpha$, weil schon $\sigma_\alpha(-\alpha) = \alpha$.

3.) Es gilt $\sigma_\alpha\left(\frac{1}{2} \sum_{\beta \in \Phi^+} \beta\right) = \sigma_\alpha\left(\frac{1}{2} \sum_{\beta \in \Phi^+ \setminus \{\alpha\}} \beta\right) + \sigma_\alpha\left(\frac{\alpha}{2}\right) \stackrel{2.)}{=} \frac{1}{2} \sum_{\beta \in \Phi^+ \setminus \{\alpha\}} \beta - \frac{\alpha}{2} = \frac{1}{2} \sum_{\beta \in \Phi^+} \beta - \alpha$.

4.) Sei $\sigma = \sigma_{\alpha_1} \cdots \sigma_{\alpha_t}$ eine reduzierte Wortdarstellung mit $\alpha_i \in \Delta$. Angenommen $\Delta \ni \beta \neq \alpha_i$ für $i=1, \dots, t$.

Nach 2.) gilt $\sigma(\beta) \in \Phi^+$, Widerspruch.

Durch Inspektion erhält man für Φ irr. von Rang 2 oder 3:

$\sigma = -\text{id}_E \Leftrightarrow \Phi$ hat Typ B_2, G_2, B_3 oder C_3 .

$\sigma \neq -\text{id}_E \Leftrightarrow \Phi$ hat Typ A_2 oder A_3 .

Für allgemeines irreduzibles Φ gilt

$-\text{id}_E \notin \mathcal{N}(\Phi) \Leftrightarrow \Phi$ hat Typ A_n, D_{2n+1} oder E_6 .