

K1: Kategorien & Funktoren

Eine Kategorie besteht aus Objekten & Morphismen.

1. Beispiele

(a) Sets: Objekte sind Mengen
Morphismen sind Abbildungen

(b) Groups: Objekte sind Gruppen
Morphismen sind Gruppenhomomorphismen

Ab : Objekte sind abelsche Gruppen
Morphismen sind Gruppenhomomorphismen

(c) Top: Objekte sind topologische Räume
Morphismen sind stetige Abbildungen

Top_• : punktierte top. Räume (X, x)
Morphismen sind stetige Abbildungen,
die den Basispunkt erhalten.

$$\text{Hom}_{\text{Top}_\bullet}((X, x), (Y, y)) \\ := \{ f \in \text{Hom}_{\text{Top}}(X, Y) \mid f(x) = y \}$$

2. Def: Eine **Kategorie** \mathcal{C} besteht aus

- einer Klasse von „Objekten“ $ob \mathcal{C}$
- einer Klasse von „Morphismen“ $Hom_{\mathcal{C}}(X, Y)$
für je zwei Objekte X und Y
- einer Verknüpfung

$$Hom_{\mathcal{C}}(X, Y) \times Hom_{\mathcal{C}}(Y, Z) \rightarrow Hom_{\mathcal{C}}(X, Z)$$
$$(f, g) \mapsto g \circ f$$

genannt „Komposition“.

$$X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{g \circ f}$

- einer „Identität“ $id_X \in Hom_{\mathcal{C}}(X, X)$
für jedes Objekt X

Dabei soll gelten:

(1) Komposition ist assoziativ:

$$h \circ (f \circ g) = (h \circ f) \circ g$$

(2) Identitäten sind neutral:

$$f \circ id_X = id_Y \circ f = f$$

für alle $f \in Hom_{\mathcal{C}}(X, Y)$.

Wir bezeichnen $ob \mathcal{C}$ bewusst nicht als Menge, da das zu Paradoxien führen würde.

Eine Kategorie ist lokal klein, wenn $\text{Hom}_C(X, Y)$ jeweils eine Menge ist. Sie ist klein, wenn $\text{ob } C$ eine Menge ist.

Beispiele (Fortsetzung):

(d) k Körper

Vec_k : Objekte sind Vektorräume / k
Morphismen sind k -lineare Abb.

fd Vec_k — endlich-dim. Vektorräume / k

(e) HoTop Homotopiekategorie

$\text{ob}(\text{HoTop}) = \text{ob}(\text{Top})$

$\text{Hom}_{\text{HoTop}}(X, Y) := [X, Y]$
:= Homotopieklassen
stetiger Abb. $X \rightarrow Y$
= $\text{Hom}_{\text{Top}}(X, Y) \cong$

wobei $f \simeq g \Leftrightarrow \exists H: [0, 1] \times X \rightarrow Y$,
 H stetig, $H_0 = f$, $H_1 = g$.


Die gewöhnliche Komposition in Top
liefert \forall wohldefinierte Komposition in HoTop
($f_0 \simeq f_1$ und $g_0 \simeq g_1$, dann auch $f_0 \circ g_0 \simeq f_1 \circ g_1$)

(f) \mathcal{C} Kategorie, $X \in \text{ob } \mathcal{C}$

$$X \downarrow \mathcal{C}: \quad \text{ob}(X \downarrow \mathcal{C}) := \left\{ \text{Morphismen } \begin{array}{c} X \\ \downarrow \\ Y \end{array} \text{ in } \mathcal{C} \right\}$$

$$\text{Hom}_{X \downarrow \mathcal{C}} \left(\begin{array}{c} X \\ \downarrow f_1 \\ Y_1 \end{array}, \begin{array}{c} X \\ \downarrow f_2 \\ Y_2 \end{array} \right)$$

$$:= \left\{ g \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y_1, Y_2) \mid g \circ f_1 = f_2 \right\}$$



Unterbeispiel: $\text{Top}_* = * \downarrow \text{Top}$

Einpunktraum

$$\mathcal{C} \downarrow Y: \quad \text{ob}(X \downarrow \mathcal{C}) := \left\{ \text{Morphismen } \begin{array}{c} X \\ \downarrow \\ Y \end{array} \text{ in } \mathcal{C} \right\}$$

$$\text{Hom}_{X \downarrow \mathcal{C}} \left(\begin{array}{c} X_1 \\ \downarrow f_1 \\ Y \end{array}, \begin{array}{c} X_2 \\ \downarrow f_2 \\ Y \end{array} \right)$$

$$:= \left\{ g \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X_1, X_2) \mid f_2 \circ g = f_1 \right\}$$


3. Def: Ein Morphismus $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ heißt **Isomorphismus**, falls es

$g \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, X)$ gibt
mit $f \circ g = \text{id}_Y$ und $g \circ f = \text{id}_X$.

Notation: $g = f^{-1}$

Beispiele:

In Sets, Groups, Ab, Vec_K ist ein Morphismus genau dann ein Isomorphismus, wenn er (als Abb. von Mengen) bijektiv ist.

In Top & Top. sind die Isomorphismen die Homöomorphismen.  Nicht jede bijektive stetige Abb. ist ein Homöomorphismus.

In HoTop sind die Isomorphismen die Homotopieäquivalenzen.

Beispiele für Kategorien (Forts.)


(g) Eine Menge S kann aufgefasst werden als kleine Kategorie mit den Elementen von S als Objekte, nur Identitäten als Morphismen.

$$\text{Hom}_S(x, x) = \{\text{id}_x\}$$

$$\text{Hom}_S(x, y) = \emptyset \quad \text{für } x \neq y$$




(h) quasigeordnete Menge := Menge mit reflexiver, transitiver Relation
∃ Identitäten
∃ Kompositionen
 kann aufgefasst werden als kleine Kategorie mit jeweils höchstens einem Morphismus von einem Objekt x zu einem Objekt y .



entspricht
 $x \leq y$

sind
 notwendig
 Isomorphismen

(i) halbgeordnete Mengen (engl.: partially ordered sets / posets)
 := Menge mit antisymmetrischer Quasiordeung
 $\hat{=}$ quasigeordnete Menge, in der die einzigen Isos die Identitäten sind.



Unterbeispiele:




S Menge, $(\mathcal{P}(S), \subseteq)$ halbgeordnete Menge

X top. Raum, $\mathcal{O}(X)$ offenen Mengen von X



$(\mathcal{O}(X), \subseteq)$ halbgeordnete Menge

(j) total geordnete Menge

\equiv kleine Kategorie mit genau einem Morphismus zwischen je zwei Objekten



(k) Äquivalenzrelation \equiv Quasiordnung, in der alle Morphismen Isomorphismen sind



(l) Ein Monoid $(M, +)$ lässt sich auffassen als kleine Kategorie \mathcal{M} mit genau einem Objekt.

$$\text{ob } \mathcal{M} = \{*\}$$

$$\text{Hom}_{\mathcal{M}}(*, *) = M$$


$$\text{Komposition} \equiv +$$

$$\text{id}_* \equiv 0 \text{ (neutrales Element von } M)$$

$$[\text{ } g^{-1} \equiv \text{ inverses Element, falls es existiert }]$$

$(\mathbb{N}, +)$:

$$\text{id} = 0$$



(m) Eine Gruppe ist ein Monoid, in dem alle Morphismen Isomorphismen sind.

(n) Ein Gruppoïd ist eine lokal kleine Kategorie, in der alle Morphismen Isomorphismen sind.

Unterbeispiel: Das Fundamentalgrupoïd $\pi(X)$ eines topologischen Raums X
 $ob \pi(X) := X$

$Hom_{\pi(X)}(x, y) :=$ Homotopieklassen von Wegen von x nach y

Komposition $=$ Hintereinanderausführen von Wegen

Insbesondere: $Hom_{\pi(X)}(x, x) = \pi_1(X, x)$

4 Notation

Wir schreiben $f \in Hom_{\mathcal{C}}(X, Y)$ oft $X \xrightarrow{f} Y$.

Ein Diagramm aus solchen Pfeilen heißt

Kommutativ, falls je zwei Kompositionen

mit gleicher Quelle und gleichem Ziel übereinstimmen.

(z.B.:
$$\begin{array}{ccc} W & \xrightarrow{g} & X \\ \downarrow i & & \downarrow f \\ Y & \xrightarrow{h} & Z \end{array}$$
 kommutativ" heißt $f \circ g = h \circ i$.)

5 Def.: Die zu einer Kategorie \mathcal{C} duale (oder opponierte) Kategorie \mathcal{C}^{op} ist gegeben durch

$$\text{ob } \mathcal{C}^{op} := \text{ob } \mathcal{C}$$

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}^{op}}(X, Y) := \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, X)$$

Beispiel: $\mathcal{C} \downarrow Y = (Y \downarrow \mathcal{C}^{op})^{op}$

6 Def.: \mathcal{C}, \mathcal{D} Kategorien.

Ein (kovarianter) Funktor $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$

besteht aus:

- einer Abb. $\text{ob } \mathcal{C} \rightarrow \text{ob } \mathcal{D}$
- Abbildungen $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{D}}(FX, FY)$,
derart, dass $F(f \circ g) = Ff \circ Fg$
 $F(\text{id}_X) = \text{id}_{FX}$

$$\begin{array}{ccc}
 \mathcal{C} & \xrightarrow{F} & \mathcal{D} \\
 X & \mapsto & FX \\
 f \downarrow & & \downarrow Ff \\
 Y & \mapsto & FY
 \end{array}$$

(Ein kontravarianter Funktor ist ein Funktor $\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}^{op}$)

Beispiele für Kategorien (Forts.)

(o) Cat

ob Cat := kleine Kategorien

$\text{Hom}_{\text{Cat}}(\mathcal{C}, \mathcal{D}) := \text{Funktionen } \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$

Beispiele für Funktoren

(a) Ein Funktor zwischen Halbgeordnete Mengen entspricht einer ordnungserhaltenden Abb.

$$(x \leq y \Rightarrow Fx \leq Fy)$$

(b) Ein Funktor zwischen Monoiden / Gruppen ist ein Homomorphismus.

(c) „vergessliche“ Funktoren

$$\text{Ab} \rightarrow \text{Groups}$$

$$\text{Groups} \rightarrow \text{Sets}$$

$$\text{Top.} \rightarrow \text{Top}$$

$$\text{Top} \rightarrow \text{Sets}$$

(d) „freie“ Funktoren

$$\text{Sets} \rightarrow \text{Ab}$$

$$S \mapsto \text{freie abelsche Gruppe auf den Elementen von } S \quad (\mathbb{Z}\langle S \rangle)$$

$$\text{Sets} \rightarrow \text{Groups}$$

$$S \mapsto \text{freie Gruppe auf den Elementen von } S \quad (\mathbb{Z}^* S \text{ oder } \langle S \rangle)$$

$$\begin{aligned}
 \mathbb{Z}^{\{a\}} &= \mathbb{Z} = \langle a \rangle \\
 \mathbb{Z}^{\{a,b\}} &= \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \neq \mathbb{Z} * \mathbb{Z} = \langle a, b \rangle \\
 &\quad \cup \\
 &\quad ab^{-1}b^{-1} \neq 1
 \end{aligned}$$

(e) Dualisierungsfunktor auf Vec_k

$$\begin{array}{ccc}
 \text{Vec}_k & \longrightarrow & \text{Vec}_k^{\text{op}} \\
 V & \longmapsto & V^* := \text{Hom}_k(V, k) \\
 f \downarrow & & \uparrow f^* \\
 W & \longmapsto & W^*
 \end{array}$$

(f) $\pi_1: \text{Top}_* \longrightarrow \text{Groups}$

$$\begin{array}{ccc}
 (X, x) & \longmapsto & \pi_1(X, x) \\
 f \downarrow & & \downarrow \pi_1(f) \\
 (Y, y) & \longmapsto & \pi_1(Y, y)
 \end{array}$$

Analog: $\pi_0: \text{Top} \longrightarrow \text{Groupoids}$

(g) Potenzmenge $\mathcal{P}: \text{Sets} \longrightarrow \text{Sets}$

$$\begin{array}{ccc}
 S & \longmapsto & \mathcal{P}(S) & \cup \subseteq S \\
 f \downarrow & & \downarrow & \downarrow \\
 T & \longmapsto & \mathcal{P}(T) & f(u) \in T
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc}
 \mathcal{P}^*: \text{Sets} & \longrightarrow & \text{Sets}^{\text{op}} \\
 S & \longmapsto & \mathcal{P}(S) & f^{-1}V \subseteq S \\
 f \downarrow & & \uparrow & \downarrow \\
 T & \longmapsto & \mathcal{P}(T) & V \subseteq T
 \end{array}$$

(h) \mathcal{C} lokal kleine Kategorie; X, Y Objekte

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, -): \mathcal{C} \longrightarrow \text{Sets}$$

$$\begin{array}{ccc} A & \mapsto & \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, A) & \ni & g \\ f \downarrow & & \downarrow f_* & & \downarrow \\ B & \mapsto & \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, B) & \ni & f \circ g \end{array}$$

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}}(-, Y): \mathcal{C} \longrightarrow \text{Sets}^{\text{op}}$$

$$\begin{array}{ccc} A & \mapsto & \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, Y) & \ni & g \circ f \\ f \downarrow & & \uparrow f^* & & \downarrow \\ B & \mapsto & \text{Hom}_{\mathcal{C}}(B, Y) & \ni & g \end{array}$$

(i) Eine Prägarbe \mathcal{F} auf einem topologischen Raum X ist ein Funktor $(\mathcal{O}(X), \subseteq) \longrightarrow \text{Sets}^{\mathcal{O}}$

\uparrow offene Mengen von X

$$\begin{array}{ccc} U & \mapsto & \mathcal{F}(U) \\ \cap & & \uparrow \\ V & \mapsto & \mathcal{F}(V) \end{array} \quad \text{"Einschränkungs-abb."}$$

z. B. $\mathcal{F} = \text{Hom}_{\text{top}}(-, \mathbb{R})$